

مطالعه کاریوتیپی بخش Hymenobrychis از جنس اسپرس (Onobrychis) در ایران

Karyotypic Study of Sect. Hymenobrychis of Onobrychis in Iran

فرنگیس قنواتی^۱، حسن اسکندری^۲، غلامرضا بخشی خانیکی^۳، بهزاد سرخی الله لو^۱
^۴حسن امیرآبادی زاده

۱- استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

۲- به ترتیب دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیو-تکنولوژی و استاد، دانشکده کشاورزی دانشگاه پیام نور، تهران

۳- کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی حراسان رضوی، مشهد

تاریخ دریافت: ۱۳۸۹/۳/۲ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۹/۸/۶

چکیده

قنواتی، ف.، اسکندری، ح.، بخشی خانیکی، غ.، سرخی الله لو، ب.، و امیرآبادی زاده، ح. ۱۳۸۹ مطالعه کاریوتیپی بخش Hymenobrychis از جنس اسپرس (Onobrychis) در ایران. مجله بهنژادی نهال و بذر ۱-۲۶، ۵۶۰-۵۴۵.

در این تحقیق یازده جمعیت از بخش Hymenobrychis جنس Onobrychis (اسپرس)، جمع آوری شده از مناطق طبیعی ایران، با استفاده از مریستم انتهایی ریشه مورد مطالعه قرار گرفت و تعداد و ابعاد کروموزم‌ها در تقسیم میتوz اندازه‌گیری و فرمول کاریوتیپی هر گونه تعیین شد. تعداد کروموزوم پایه در گونه‌ها بین $x=2$ و $x=8$ و نوع کروموزوم‌ها نیز از نوع متاستریک (m) تا ساب متاستریک (sm) بود. بیشترین میانگین طول ژنوم متعلق به گونه *O. chorassanica* (۲۲/۱ میکرومتر) و کمترین آن متعلق به گونه *O. amoana* subsp. *meshhedensis* (۱۴/۴ میکرومتر) بود. نتایج تجزیه واریانس ویژگی‌های کروموزومی نشان داد که بین گونه‌های مورد مطالعه اسپرس از نظر اکثر صفات در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی‌دار وجود داشت. برخلاف سایر گونه‌ها که در کلاس A استیبنز بودند، گونه 2 در کلاس B قرار گرفت و دارای کاریوتیپ نسبتاً نامتقارن‌تر بود. گونه *O. amoena* subsp. *meshhedensis* با داشتن فرمول کاریوتیپی ۱۴m، قرار گرفتن در کلاس A، بیشترین طول نسبی کروموزوم (۶۸/۲۶ میکرومتر)، کمترین دامنه طول نسبی کروموزوم (۵/۳۱ میکرومتر)، کمترین عدم تقارن بین کروموزومی (۰/۱۲) و درصد فرم کلی بالا به عنوان متفاوت‌ترین گونه بود که نشان‌دهنده ابتدایی تر بودن این گونه است. در تجزیه به مولفه‌های اصلی، سه مولفه اول بیش از ۹۵٪ درصد از تنوع بین داده‌ها را توجیه کردند. با توجه به گروه‌بندی گونه‌ها بر اساس پارامترهای کروموزومی بیشترین شباهت بین جمعیت‌های گونه *O. mazanderanica* و کمترین فراابت و نزدیکی بین گونه‌های *O. michauxii* و *O. mazanderanica* وجود داشت.

واژه‌های کلیدی: اسپرس، بخش Hymenobrychis، تکامل، تعداد کروموزوم، کاریوتیپ.

گونه‌ها تنوع ژنتیکی بالای داشته و به عنوان ذخیره ژنتیکی غنی و ارزشمند می‌توان از آن‌ها برای اصلاح گونه‌های زراعی استفاده کرد. ذخیره ژنی این جنس دارای سطوح پلوئیدی متفاوت دیپلولوئید و تترابلولوئید با عدد پایه کروموزومی متفاوت ۷، ۸ و ۹ است. میرزاچی ندوشن و فیاضی (Mirzaie-Nodoushan and Fayazi, 1998) ده جمعیت از گونه *O. sativa* را از نظر تقارن کاریوتیپی مورد مطالعه قرار دادند. با بررسی کاریوتیپ چهار گونه اسپرس نشان داده شد *O. aucheri* ssp. *tehranica* که گونه *O. scrobiculata*, *O. melanotricha* و *O. oxyptera* دارای ۱۶ کروموزوم هستند و براساس عدد پایه کروموزومی $x = 8$ گونه‌های دیپلولوئید محسوب می‌شوند (Ansari Asl et al., 2000). حاتمی و نصیرزاده (Hatami and Nasirzadeh, 2006) پس از مطالعه در مورد دو زیر گونه *Onobrychis aucheri* subsp. *tehranica* و *O. aucheri* subsp. *psammophila* کردن که با توجه به خصوصیات ریخت‌شناسی و صفات کروموزومی در هر دو تاکسون مشخص می‌شد که این دو زیر گونه با یکدیگر دارای اختلاف ظاهری و کروموزومی بوده بنابراین نمی‌توان آن‌ها را به عنوان دو زیر گونه از یک گونه تلقی کرد. حسامزاده حجازی و ضیائی نسب (Hesamzadeh Hejazi and Ziae Nasab, 2009)

مقدمه

جنس اسپرس (*Onobrychis*) با دارا بودن بیش از ۱۳۰ گونه یک ساله و چندساله در نواحی معتمده شمالی کره زمین گسترش دارد و مرکز تنوع آن شرق مدیترانه و غرب آسیا است. رشینگر (Rechinger, 1984)، هفتاد و هفت گونه اسپرس ناحیه ایرانیکا را در قالب دو زیر جنس و نه بخش معرفی کرد. زیر جنس *Afghanica* شامل پنج بخش *Sisyrosema* و *Hymenobrychis* *Hellobrychis* *Anthyllium* *Onobrychis* و *Insignes* دارای چهار بخش و *Dendrobrychis* *Laxiflora* است. رنجبر و همکاران (Ranjbar et al., 2004, 2006, 2007) امیرآبادی زاده و همکاران (Amirabadizadeh et al., 2006, 2009) چند گونه از جنس *Onobrychis* را به عنوان گونه‌های جدید از ایران معرفی کردند. در ایران جنس *Onobrychis* دارای ۶۳ گونه‌ی (۱۳) گونه یک ساله و ۵۰ گونه چند ساله است که ۱۱ گونه آن به بخش *Hymenobrychis* تعلق دارد و در بین آن‌ها ۴ گونه، زیر گونه و واریته فقط از ایران گزارش شده‌اند. تعدادی از گونه‌های این بخش دارای ارزش علوفه‌ای بوده و برای کنترل فرسایش و یا به عنوان گیاهان جلب کننده زنبور عسل مورد استفاده قرار می‌گیرند (Lock and Simpson, 1991; Yakovlev et al., 1996; Mabberley, 1997).

ریشه‌چههای گیاهان مورد بررسی با توسط محلول پیش تیمار-۸-هیدروکسی کینولئین، تثبیت کننده لویتسکی و رنگ هماتوکسیلین و بر اساس روش قنواتی و همکاران (۲۰۱۰) آماده سازی شدند. و ۵-۱۰ پنهانه متافازی میتوز سلول‌های مریستم نوک ریشه برای هر گونه مطالعه شد.

در تمام نمونه‌های مورد مطالعه ابتدا تعداد کروموزم در هسته سلول شمارش شد و پارامترهای کاریوتیپی نظیر طول کل کروموزوم (TL)، مجموع طول بازوی بلند (L) و مجموع طول بازوی کوتاه (S) توسط نرم افزار Micromeasure 3.3 بر حسب میکرون اندازه گیری شد و براساس نسبت بازوی بلند به کوتاه (AR) و شاخص ضریب سانترومی (CI) که بیانگر نسبت بازوی کوتاه به طول کل کروموزوم است، محاسبه شد. دیگر پارامترهای کاریوتیپی مانند درصد شکل کلی (TF%)، اختلاف درصد طول نسبی بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین کروموزوم (DRL%)، طول نسبی کوتاه‌ترین کروموزوم (S%)، ضریب نامتقارن بودن درون کروموزومی (A1) و بین کروموزومی (A2) محاسبه شدند. در این بررسی برای تعیین وضعیت تکاملی و مطالعه تقارن کاریوتیپی جمعیت‌ها از جدول دو طرفه استیبلیز استفاده شد (Stebbins, 1971). به منظور تجزیه آماری داده‌های حاصل از اندازه گیری صفات کروموزومی، تجزیه واریانس انجام شد. همبستگی و مقایسه میانگین

ضمن بررسی ۲۱ جمعیت از ۱۴ گونه اسپرس دریافتند که گونه *O. crista-galli* با فرمول کاریوتیپی $2m+6sm$ و گونه *O. aucheri* با فرمول کاریوتیپی $8m$ به ترتیب نامتقارن‌ترین و متقارن‌ترین کاریوتیپ هستند. در بررسی آن‌ها، گونه *O. hohenackeriana* با داشتن بیشترین تغییرات بین کروموزومی نامتقارن‌ترین کاریوتیپ را داشت. قنواتی و همکاران (Ghanavati et al., 2010) گونه‌های بخش Heliobrychis را مورد ارزیابی قرار دادند و دریافتند که گونه *O. oxyptera* نامتقارن‌ترین و گونه‌های *O. lunata* و *O. heliocarpa* متقارن‌ترین گونه‌های این بخش هستند. در پژوهش حاضر با شمارش و اندازه گیری کروموزم‌های مرحله متافازی میتوز گونه‌های بخش Hymenobrychis که بسیاری از آن‌ها مخصوص ایران هستند و تاکنون مطالعات کروموزومی آن‌ها به طور کامل انجام نشده است، ضمن تعیین عدد کروموزومی، مطالعه شکل و منظور تعیین عدد کروموزومی، مطالعه شکل و اندازه کروموزوم‌ها و تکامل کاریوتیپی، گونه‌های نزدیک به یکدیگر نیز برای انجام تلاقي بین گونه‌های با استفاده از روش‌های تجزیه آماری چند متغیره تعیین شدند.

مواد و روش‌ها

یازده تاکسون اسپرس مربوط به Sect. Hymenobrychis از نظر مشخصات کروموزومی مورد مطالعه قرار گرفتند.

Ansari Asl *et al.*, 2000, 2001
Cao, 1984; Goldblatt, 1992-1993
(Zohary, 1972). از نظر تعداد ماهواره‌ها، نیز همه گونه‌ها دو ماهواره داشتند. همچنین این مطالعه نشان داد که هر چند گونه‌ها و جمعیت‌های مختلف اسپرس دارای تعداد متفاوتی کروموزم پایه هستند ولی همگی در داشتن کروموزم‌های کوچک مشترک هستند، به عبارت دیگر در مقایسه با بسیاری از گونه‌ها و جنس‌های دیگر گیاهی میانگین طول کروموزم‌های اسپرس کوچک‌تر است. مقایسه میانگین طول ژنوم گونه‌های اسپرس نیز نشان داد که بیشترین میانگین طول ژنوم *O. chorassanica* و *O. amoana* subsp. *meshhedensis* (۱۴/۴۰۹ میکرومتر) و کمترین آن متعلق به گونه *O. amoana* subsp. *meshhedensis* (۱۴/۲۲ میکرومتر) بود.

با استفاده از نسبت اندازه طول بازوی بلند بر بازوی کوتاه کروموزم‌ها و براساس نظر لوان و همکاران (Levan *et al.*, 1964) فرمول کاریوتیپی گونه‌های مورد بررسی تعیین شد. ویژگی‌های کاریوتیپی گونه‌ها در جدول ۲ نشان داده شده است. گونه‌های این جنس دارای تیپ کروموزومی متاستریک تا سابمتاستریک بودند. به طوری که تمام کروموزوم‌های *O. schahuensis* ۱، *O. michauxii* و *O. amoena* subsp. *meshhedensis* از نوع متاستریک و سایر گونه‌ها تلفیقی از متاستریک تا سابمتاستریک تعیین شد که موید

صفات نیز با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن (در سطح احتمال ۱٪) انجام شد. برای تعیین سهم هر یک از صفات اندازه‌گیری شده در ایجاد تنوع بین جمعیت‌ها، تجزیه به مولفه اصلی و برای گروه‌بندی آن‌ها تجزیه کلستر (UPGMA) انجام شد. تجزیه آماری داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS 16، SAS 9 و NTSYS 2.02 انجام شد.

نتایج و بحث

نام و رویشگاه گونه‌های مورد مطالعه در جدول ۱ نشان داده شده است. گونه‌های *O. mazanderanica*، *O. subnitens* و *O. amoena* subsp. *meshhedensis* انحصاری ایران هستند و برای اولین بار در این تحقیق مطالعات کاریوتیپی آن‌ها انجام شد. تصاویر صفحه متابازی و کاریوگرام گونه‌های مورد مطالعه در شکل ۱ و ایدیوگرام مربوط به آن‌ها در شکل ۲ ارائه شده است. از نظر تعداد کروموزوم پایه، بین گونه‌ها عدد پایه کروموزومی ۷ و ۸ مشاهده شد. گونه *O. michauxii* با عدد پایه کروموزومی ۸ دارای $2n=2x=16$ کروموزوم و سایر گونه‌ها با عدد پایه کروموزومی ۷ دارای $2n=2x=14$ تعداد $x=7$ کروموزوم داشتند و همگی دیپلوئید بودند. نتایج مطالعات سیتوژنتیکی توسط دیگر محققین در مورد این جنس نیز موید نتایج این تحقیق است (Hesamzadeh Hejazi and Ziae Nasab, 2009)

جدول ۱ - گونه‌های مورد مطالعه بخش Hymenobrychis و رویشگاه‌های آن‌ها در ایران

Table 1. Studied species of sect. Hymenobrychis and their habitats in Iran


Species	Habitate
<i>O. mazanderanica</i> 1 Rech.f.	Mazandaran: Noshahr, Zaloos, Dalam, 571†
<i>O. mazanderanica</i> 2 Rech.f.	Mazandaran: Sari, Narmabdos, Saidabad, 171†
<i>O. amoena</i> M. Pop. et Vved. subsp. <i>amoena</i>	Bojnord, Shoghan, 2000m
<i>O. amoena</i> subsp. <i>meshhedensis</i> Širj. & Rech.f.	Fariman, Arrehkamar, 1900m
<i>O. subnitens</i> 1 Bornm.	East Azarbaijan: Sarab, 278†
<i>O. subnitens</i> 2 Bornm.	East Azarbaijan: Hashtroud, Zolbin, 318†
<i>O. schahuensis</i> 1 Bornm.	Kermanshah, Eslamabad-e- Gharb, Govareh, 419†
<i>O. schahuensis</i> 2 Bornm.	Kermanshah: Javanroud, 413†
<i>O. chorassanica</i> Bunge.	Khorasan Razavi: Mashhad, Kalat road to Dargaz, 588†
<i>O. michauxii</i> 1 DC.	East Azarbaijan: Mianeh, 291†
<i>O. michauxii</i> 2 DC	East Azarbaijan: Kaleibar, 280†

† شماره TN نمونه در بانک ژن گیاهی ملی ایران.

‡ Number of TN in National Plant Genebank of Iran.


داد که بین گونه‌های مختلف اسپرس از نظر صفات مجموع طول بازوهای کوتاه (S)، شاخص سانترومری (CI) و نسبت طول بازوی کوتاه به بازوی بلند (r-value) در سطح یک درصد و در مورد صفات طول کل کروموزوم (TL)، نسبت طول بازوی بلند به بازوی کوتاه (AR) درسطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی‌دار وجود داشت و برای صفت مجموع طول بازوهای بلند کروموزوم (L) اختلاف معنی‌دار وجود نداشت (جدول ۳). معنی‌دار بودن صفات کروموزومی بیانگر تنوع کاریوتیپی در بین گونه‌های مورد مطالعه است که این امر

نظر محققین قبلی از جمله جسامزاده حجازی و ضیائی نسب (۲۰۰۹) و Abou-El-Enain (2002) است. گونه *O. michauxii* 1 با فرمول کاریوتیپی ۱۶m+۴m باشد که این درصد شکل کلی (۴۳/۹۶۶) و کمترین بیشترین درصد شکل کلی (۳۵/۶۸۲) از مقدار شاخص نامتقارن بودن درون کروموزومی (۰/۲۰۴) برخوردار باشد و گونه *O. chorassanica* با فرمول کاریوتیپی ۶m+۸sm کمترین درصد شکل کلی (۳۵/۶۸۲) و بیشترین شاخص عدم تقارن درون کروموزومی (۰/۴۳۲) را نشان داد. نتایج تجزیه واریانس صفات مربوط به کروموزوم‌ها نشان



شکل ۱- متاباز میتوزی به همراه کاریوگرام چند گونه از بخش Hymenobrychis

Fig.1. Metaphase mitosis and karyogram of some species of sect. Hymenobrychis



شکل ۲- ایدیوگرام چندگونه از بخش Hymenobrychis

Fig .2. Idiogram of some species of sect. Hymenobrychis

جدول ۲- ویژگی های کاریوتیپی چند گونه از بخش Hymenobrychis
Table 2. Karyotypic characteristics of some species of Hymenobrychis

Species	2n	X	DRL%	TF%	S%	A1	A2	SC	sat	KF
<i>O. mazanderanica</i> 1	14	7	7.247	38.827	60.050	0.345	0.186	1A	2	10m+4sm
<i>O. mazanderanica</i> 2	14	7	6.618	36.437	61.197	0.416	0.150	2A	2	8m+6sm
<i>O. amoena</i> subsp. <i>meshhedensis</i>	14	7	5.319	41.228	68.269	0.277	0.125	1A	2	14m
<i>O. amoena</i> subsp. <i>amoena</i>	14	7	5.574	37.450	66.450	0.395	0.139	1A	2	10m+4sm
<i>O. subnitens</i> 1	14	7	8.675	38.770	51.988	0.352	0.215	2A	2	12m+2sm
<i>O. subnitens</i> 2	14	7	8.720	38.185	50.863	0.373	0.223	1A	2	12m+2sm
<i>O. schauhensis</i> 1	14	7	6.656	41.020	62.738	0.289	0.171	1A	2	14m
<i>O. schauhensis</i> 2	14	7	7.633	36.288	58.296	0.401	0.199	2A	2	6m+8sm
<i>O. chorassanica</i>	14	7	7.434	35.686	58.878	0.432	0.187	2A	2	6m+8sm
<i>O. michauxii</i> 1	16	8	9.161	43.966	48.977	0.204	0.258	1A	2	16m
<i>O. michauxii</i> 2	16	8	10.537	43.362	42.617	0.227	0.290	1B	2	16m

2n: تعداد کروموزوم؛ X: عدد پایه کروموزومی؛ DRL%: اختلاف دامنه طول نسبی؛ TF%: درصد فرم کلی؛ S%: طول نسبی کوتاهترین کروموزوم؛ A₁: شاخص عدم تقارن درون کروموزومی؛ A₂: شاخص نامتقارن بودن بین کروموزومی SC: کلاس استیبنز sat: ستلاتیت؛ KF: فرمول کاریوتیپی.

2n: Number of chromosomes; X: Base of chromosomes; DRL: Difference of relative length; TF%: Total form percentage; S%: Relative length of shortest chromosome; A₁: Intra asymmetry chromosomal index; A₂: Inter asymmetry chromosomal index; SC: Stebins Class; sat: satelait; KF: Karyotypic formula.

ثبت و با سایر صفات همبستگی چندانی نشان نمی‌دهد. در حالی که مجموع طول بازوهای کوتاه (S) از بیشترین همبستگی با سایر صفات برخوردار بود و با افزایش مجموع طول بازوی کوتاه (S)، مجموع طول بازوهای بلند (L)، طول کل کروموزوم (TL)، نسبت بازوی کوتاه به بازوی بلند (r-value) و شاخص سانترومیری (CI) افزایش می‌یابد (جدول ۴). از نظر میانگین

می‌تواند دلیلی بر انجام مطالعات جامع کروموزومی جهت تعیین وضعیت تکاملی و بررسی قرابت و خویشاوندی گونه‌های مختلف اسپرس باشد.

نتایج تجزیه همبستگی کلیه صفات کاریوتیپی نشان داد که طول کل کروموزوم (TL) با صفات مجموع طول بازوهای بلند (L) و مجموع طول بازوهای کوتاه (S) همبستگی

جدول ۳ - تجزیه واریانس ویژگی‌های کاریوتیپی گونه‌های مختلف بخش Hymenobrychis

Table 3. Analysis of variance for the karyotypic characteristics of different species of Hymenobrychis

S.O.V.	منابع تغییرات	df.	میانگین مربعات MS					CI
			S	L	TL	AR	r-value	
Species	گونه گیاهی	10	3.32 **	5.04 ^{ns}	17.27 *	3.32 *	1.98 **	0.51 **
Error	خطا	22	0.94	3.34	5.63	1.08	0.18	0.04
CV%	ضریب تغییرات		12.94	15.42	12.37	9.21	8.88	7.76

ns، * و **: به ترتیب غیر معنی دار ، معنی دار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد.

ns, * and **: Not significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively .

S: مجموع طول بازوهای کوتاه ؛ L: مجموع طول بازوهای بلند ؛ TL: طول کل کروموزوم ؛ AR: نسبت طول بازوی کوتاه به بازوی بلند ؛

CI: شاخص سانترومری.

S: Sum length of short arms; L: Sum length of long arms ; TL: Total length of chromosome; AR: Ratio of long arm to short arm; r- value:

Ratio of short arm to long arm; CI: Centromeric Index.

جدول ۴- ضرایب همبستگی ساده ویژگی‌های کاریو‌تیپی در گونه‌های بخش Hymenobrychis
Table 4. Simple correlation coefficients for different karyological characters in sect. Hymenobrychis

	S	L	TL	AR	r-value
L	0.56**				
TL	0.86**	0.81**			
AR	-0.25 ns	0.36*	0.21 ns		
r-value	0.43*	-0.31 ns	-0.05 ns	-0.75**	
CI	0.38*	-0.30 ns	-0.04 ns	-0.61**	0.91**

ns ، * و **: به ترتیب غیر معنی دار ، معنی دار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد.

ns, * and **: Not significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively .

S: مجموع طول بازوهای کوتاه ؛ L: مجموع طول بازوهای بلند ؛ TL: طول کل کروموزوم ؛ AR: نسبت طول بازوی بلند به بازوی کوتاه؛ r-value: نسبت طول بازوی کوتاه به بازوی بلند ؛ CI: شاخص سانترومری.

S: Sum length of short arms; L: Sum length of long arms ; TL: Total length of chromosome;
AR: Ratio of long arm to short arm; r- value: Ratio of short arm to long arm; CI: Centromic Index.

با سایر گونه‌ها تفاوت داشت. مقایسه میانگین طول بلندترین کروموزوم نیز نشان داد که بین گونه‌های مختلف از نظر این صفت اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. از نظر شاخص سانترومری نیز بین جمعیت‌های گونه *O. michauxii* و سایر گونه‌ها اختلاف معنی‌دار وجود داشت (جدول ۵).

گونه‌های مورد مطالعه با استفاده از روش (Stebbins 1971) از نظر کاریو‌تیپی نیز مورد مقایسه قرار گرفتند. در میان گونه‌های مورد بررسی گونه 2 *O. michauxii* بر خلاف سایر گونه‌ها که در کلاس A استیتیز بودند در

طول بازوی کوتاه (S) و طول بازوی بلند (L) تنوع زیادی بین جمعیت‌های مختلف وجود داشت، به نحوی که کمترین میانگین مجموع طول بازوی کوتاه (۵/۹۳ میکرومتر) به گونه *O. amoena* subsp. *meshhedensis* کمترین میانگین مجموع طول بازوی بلند (۱۰/۱۸ میکرومتر) به گونه 2 *O. michauxii* تعلق داشت. بیشترین میانگین مجموع طول بازوی بلند (۱۴/۲۱ میکرومتر) مربوط به گونه *O. chorassanica* و بیشترین میانگین مجموع طول بازوی کوتاه (۷/۹۸ میکرومتر) به گونه 1 *O. schauhensis* تعلق داشت. همچنین نتایج نشان داد که میانگین مجموع بازوهای بلند گونه

جدول ۵ - مقایسه میانگین ویژگی های کاریوتیپی گونه های مختلف بخش Hymenobrychis
 Table 5. Mean comparison of karyotypic characteristics of different species of Hymenobrychis

Species	S	L	TL	AR	r-value	CI
<i>O. mazanderanica</i> 1	7.95ab	12.47ab	20.43abc	11.23abcd	4.58bcd	2.74b
<i>O. mazanderanica</i> 2	7.24bc	12.79ab	20.14abc	12.67a	4.08d	2.55b
<i>O. amoena</i> subsp. <i>meshhedensis</i>	5.93c	10.44b	14.41d	10.00cd	5.06b	2.90b
<i>O. amoena</i> subsp. <i>amoena</i>	7.41bc	12.44ab	19.86abc	11.85abc	4.23cd	2.62b
<i>O. subnitens</i> 1	8.07ab	12.85ab	20.9abc	11.13abcd	4.53bcd	2.72b
<i>O. subnitens</i> 2	6.25bc	10.18b	16.43cd	11.29abcd	4.38bcd	2.68b
<i>O. schauhensis</i> 1	7.98ab	11.44ab	19.42abc	9.77d	4.97bc	2.88b
<i>O. schauhensis</i> 2	6.33bc	11.09ab	17.43bcd	12.46ab	4.19cd	2.57b
<i>O. chorassanica</i>	7.93ab	14.21a	22.14a	12.77a	3.97d	2.51b
<i>O. michauxii</i> 1	9.65a	12.30ab	21.95ab	10.38cd	6.36a	3.52a
<i>O. michauxii</i> 2	7.74bc	10.14b	17.89abcd	10.61bcd	6.17a	3.79a

در هر ستون میانگین هایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختلاف معنی داری ندارند.


Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using Duncan's Multiple Range Test.

S: مجموع طول بازو های کوتاه؛ L: مجموع طول بازو های بلند؛ TL: طول کل کروموزوم؛ AR: نسبت طول بازوی بلند به بازوی کوتاه؛ r-value: نسبت طول بازوی کوتاه به بازوی بلند؛ CI: شاخص سانترومی.

S: Sum length of short arms; L: Sum length of long arms ; TL: Total length of chromosome; AR: Ratio of long arm to short arm; r-value: Ratio of short arm to long arm; CI: Centromic Index.

نامتقارن تر بودن و پیشرفتہ تربودن این گونه ها است. از طرفی با توجه به این که دو شاخص A_1 و A_2 تقارن کاریوتیپ را بیان می کنند، با استفاده از گروه بندی گونه ها بر اساس مقادیر A_1 و A_2 در مقابل هم می توان میزان تقارن یا عدم تقارن هر کاریوتیپ را نیز بررسی کرد (Romero Zarco, 1986).

بر اساس کلاس B قرار گرفت و دارای کاریوتیپ های نامتقارن تر بود که نشان دهنده پیشرفتہ بودن این گونه است. این جمعیت در میان گونه هایی که در کلاس A قرار گرفتند گونه های *O. subnitens* 1، *O. mazanderanica* 2، *O. chorassanica* و *O. schauhensis* 2 در کلاس A ۲ قرار گرفتند که نشان دهنده



شکل ۳- دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه‌ای گونه‌های بخش Hymenobrychis بر اساس دو پارامتر A2 و A1

Fig. 3. Dendrogram of cluster analysis of different species of Hymenobrychis based on A1 and A2 parameters

متقارن‌ترین گونه شناخته شد که نشان‌دهنده ابتدایی‌تر بودن این گونه است.

برای تعیین نقش هر یک از صفات کاریوتیپی مورد مطالعه در تنوع بین گونه‌ها، تجزیه به مولفه‌های اصلی بر پایه میانگین شش صفت انجام شد. بر این اساس صفات مورد مطالعه به سه مولفه تقسیم شدند که در مجموع $\frac{95}{4}$ درصد از تنوع بین داده‌ها را توجیه کرد (جدول ۶) به طوری که در مولفه اول، صفات نسبت بازوها و شاخص سانترومی با دارا بودن بالاترین ضرایب بردارهای ویژه بیشترین نقش را در ایجاد تنوع بین جمعیت‌ها داشتند. در مولفه دوم و سوم نیز صفات طول بازوی کوتاه و طول بازوی بلند دارای بیشترین اهمیت در واریانس بین جمعیت‌ها بودند. نتایج این بررسی با نتایج حسامزاده حجازی و ضیائی نسب (۲۰۰۹) در


دندروگرام گونه‌ها در شکل ۳، گونه‌ها در دو دسته قرار گرفتند. دسته اول دارای مقادیر کمتر A₂ بودند که این مطلب نشان‌دهنده متقارن‌تر بودن کاریوتیپ آن‌ها است. گونه‌های O. amoena subsp. amoena و O. amoena subsp. meshhedensis جمعیت‌های گونه O. mazanderanica در این دسته قرار گرفتند. سایر گونه‌ها در دسته دوم قرار گرفتند که نشان‌دهنده نامتقارن‌تر بودن این گونه‌ها است. در مجموع گونه O. amoena subsp. meshhedensis با داشتن فرمول کاریوتیپی ۱۴m، قرار گرفتن در کلاس ۱A، بیشترین طول نسبی کروموزوم (۶۸/۲۶)، کمترین دامنه طول نسبی کروموزوم (۵/۳۱)، کمترین میزان نامتقارن بودن بین کروموزومی (۰/۱۲) و درصد فرم کلی بالا به عنوان

جدول ۶- تجزیه به مولفه های اصلی ویژگی های چند گونه از بخش Hymenobrychis
Table 6. Principale components analysis of karyotypic characteristics of some species of Hymenobrychis

صفات Characteristic	مولفه های اصلی		
	Principal components		
	اول First	دوم Second	سوم Third
S	0.06	0.707	0.56
L	0.01	0.69	-0.66
TL	0.45	0.06	0.38
AR	0.50	-0.06	-0.16
r-value	-0.51	0.05	0.09
CI	0.51	0.04	0.12
مقادیر ویژه	3.66	1.52	0.53
واریانس نسبی	61.04	25.47	8.95
واریانس تجمعی	61.04	86.51	95.46

S: مجموع طول بازو های کوتاه؛ L: مجموع طول بازو های بلند؛ TL: طول کل کروموزوم؛ AR: نسبت طول بازوی بلند به بازوی کوتاه؛ r-value: نسبت طول بازوی کوتاه به بازوی بلند؛ CI: شاخص سانترومی.

S: Sum length of short arms; L: Sum length of long arms ; TL: Total length of chromosome;
AR: Ratio of long arm to short arm; r- value: Ratio of short arm to long arm; CI: Centromic Index.



شکل ۴- دندرو گرام حاصل از تجزیه خوش ای گونه های بخش Hymenobrychis بر اساس ویژگی های کاریوتیپی

Fig. 4. Dendrogram of cluster analysis of different species of Hymenobrychis based on karyotypic characteristics

برخوردار نخواهد بود. وجود شباهت‌های کروموزومی بسیار زیاد بین جمعیت‌های مورد مطالعه به دلیل جایگاه این جمعیت‌ها در رده‌بندی جنس *Onobrychis* است، گونه‌های مورد مطالعه همگی متعلق به بخش *Hymenobrychis* هستند که شباهت‌های مورفولوژیکی بسیار زیادی نیز بین آن‌ها وجود دارد. در مجموع این بخش دارای کروموزوم‌های تقریباً متقارن و از این‌رو گونه‌های ابتدایی هستند. شمارش تعداد کروموزم‌ها و اندازه‌گیری ابعاد آن‌ها و تعیین اختلاف‌های احتمالی بین کروموزم‌های گونه‌های مختلف می‌تواند به عنوان ابزاری در تعیین احتمال موفقیت در انجام تلاقی‌های بین گونه‌ای به کار گرفته شود (Lemmi *et al.*, 1995). نتایج حاصل از این تحقیق برای انتخاب گونه‌های نزدیک به یکدیگر برای انجام تلاقی بین گونه‌ای گونه‌های بخش *Hymenobrychis* که اکثراً انحصاری ایران هستند و برای اولین بار بررسی شدند قابل استفاده خواهد بود.

مورد گونه‌های دیگری از اسپرس مطابقت دارد.

به منظور گروه‌بندی گونه‌ها تجزیه خوش‌های بر پایه کلیه صفات کاریوتیپی، با استفاده از نرم‌افزار NTSYS و به روش UPGMA انجام شد (شکل ۴). بر این اساس گونه‌های مورد مطالعه در سه گروه مجزا قرار گرفتند. گروه اول شامل جمعیت‌های *O. michauxii* و *O. subnitens* بود، در این گروه جمعیت‌های دو گونه تشکیل گروه‌های مجزا را دادند. گونه *O. amoena* subsp. *Meshhedensis* در گروه جداگانه قرار گرفت. سایر گونه‌ها در گروه سوم جای داشتند. در این میان دو جمعیت گونه *O. mazanderanica* گروه مجزایی را تشکیل دادند. با توجه به گروه‌بندی گونه‌ها بر اساس خصوصیات کروموزومی (شکل ۴) بیشترین شباهت بین جمعیت‌های گونه *O. mazanderanica* و کمترین قرابت و نزدیکی بین گونه‌های *O. mazanderanica* و *O. michauxii* وجود داشت، که بدون شک انجام تلاقی بین این دو گونه از موفقیت چندانی

References

- Abou-El-Enain, M. M. 2002.** Choromosomal criteria and their phylogenetic implication in the genus *Onobrychis* Mill sect. *Lophobrychis* (Leguminosae), with special reference to Egyptian species. Botanical Journal of the Linnean Society 139: 409-414.
- Amirabadizadeh, H., Abbasi, M., and Ranjbar, M. 2006.** A new species of *Onobrychis* sect. *Hellobrychis* (Tribe Hedysareae) from Iran. Iranian Journal of Botany 12: 187-190 (in Persian).

- Amirabadizadeh, H., Ghanavati, F., Abbassi, M., and Ranjbar, M. 2009.** A new species of *Onobrychis* sect. *Afghanicae* (Fabaceae) from Iran. Iranian Journal of Botany 15: 45-50 (in Persian).
- Ansari Asl, F., Ahmadian, P., and Nasirzadeh, A. 2000.** Cytological study of *Onobrychis* germplasm in Tehran province. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research 5: 36-56 (in Persian).
- Ansari Asl, F., Nasirzadeh, A., and Hatami, A. 2001.** Collection, identification and determination of genetic resources of *Onobrychis* genus in Fars province. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research 6(2): 131-140 (in Persian).
- Cao, Z. Z. 1984.** Study of the karyotype of *Onobrychis vicifolia*. Zhongguo Caoyuan Grassland of China 1: 54-55.
- Ghanavati, F., Tajdini, M., Yousefi, M., and Amirabadizadeh, H. 2010.** Cytogenetical study on species of Sect. *Heliobrychis* of *Onobrychis* in Iran. Seed and Plant Improvement Journal 26: 269-284 (in Persian).
- Goldblatt, P. 1992-1993.** Index to Plant Chromosome Numbers for 1992- 1993. Monographs in Systematic Botany, Vol. 58. Botanical Garden, Saint Lois Missouri.
- Hatami, A., and Nasirzadeh, A.R. 2006.** Change in rank position of two *Onobrychis* subspecies according to morphological and karyotypic studies in Fars province. Pajouhesh & Sazandegi 75: 186-191 (in Persian).
- Hesamzadeh Hejazi, S.M., and Ziae Nasab, M. 2009.** Cytogenetic study on several populations of diploid species of *Onobrychis* in natural gene bank of Iran. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research 16(2): 158-179 (in Persian).
- Lemmi, G., Lorenzetti, S., and Negri, V. 1995.** The annual medic collection of the Istituto de Miglioramento Genetico Vegetale of the University of Perugia. Herba 8: 43-52.
- Levan, A., Fredga, K., and Sandberg, A. A. 1964.** Nomenclature for centromeric position on chromosomes. Hereditas 52: 201-220.
- Lock, J. M., and Simpson, K. 1991.** Legume of the West Asia: A Chek-list. Royal Botanical Gardens, Kew. UK. 452pp.

- Mabberley, D. J. 1997.** The Plant Book. A Portable Dictionary of the Vascular Plants, 2nd ed. Cambridge, UK. 342pp.
- Mirzaie-Nodoushan, H., and Fayazi, M. A. 2000.** Selection indices in some sainfoin (*Onobrychis sativa*) population. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research 5 : 14-18 (in Persian).
- Ranjbar, M., Amirabadizadeh, H., Karamian, R., and Ghahremani, M. A. 2004.** Notes on *Onobrychis* sect. *Heliobrychis* (Fabaceae) in Iran. Willdenowia 34: 187-190.
- Ranjbar, M., Karamian, R., and Johartchi, M. R. 2006.** Notes on the taxonomy of *Hedysarum* (Fabaceae) in Iran. Annual Botany Fennici 43: 152-155.
- Ranjbar, M., Karamian, R., Tolui, Z., and Amirabadizadeh, H. 2007.** *Onobrychis assadii* (Fabaceae)a new species from Iran. Annual Botany Fennici 44:481-484.
- Rechinger, K. H. 1984.** Papilionaceae. pp. 387- 464. In: Rechinger, K. H. (ed.) Flora Iranica 157.
- Romero Zarco, C. 1986.** A new method for estimating karyotype asymmetry. Taxon 36: 526-530.
- Stebbins, G. L. 1971.** Chromosomal Evolution in Higher Plants. Edwardm Arnold (Publisher) Ltd., London.
- Yakovlev, G. P., Sytin, A. K., and Roskov, J. R. 1996.** Legumes of Northern Eurasia, a Checklist, Kew., UK. 542pp.
- Zohary, M. 1972.** Flora Palestina, Part Two. The Israel Academy of Scinces and Humanities. Israel.