

ارزیابی مقاومت کلون‌های میانرس سیب‌زمینی نسبت به بیماری پوسیدگی خشک فوزاریومی

Evaluation of Resistance of Medium Maturing Potato Clones to Fusarium Dry Rot

رامین حاجیان‌فر^۱، حسن حسن‌آبادی^۲ و رامین رافضی^۳

۱- مریبی، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

۳- مریبی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، ورامین

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۱۰/۲۳ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۵/۳۱

چکیده

حاجیان‌فر، ره.، حسن‌آبادی، ح. و رافضی، ره.، ۱۳۹۳. ارزیابی مقاومت کلون‌های میانرس سیب‌زمینی نسبت به بیماری پوسیدگی خشک فوزاریومی. مجله بهنژادی نهال و بذر ۱۱۴: ۱۱۴-۱۰۳.

در این تحقیق مقاومت ۲۹ کلون سیب‌زمینی در مقایسه با ارقام تجاری و رقم شاهد حساس Lady Roseta به بیماری پوسیدگی خشک فوزاریومی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور غده کلون‌ها و ارقام سیب‌زمینی با انجام آلودگی مصنوعی در آزمایشگاه با استفاده از جدایه‌های مهاجم و بیماریزای گونه‌های Fusarium solani و Fusarium sambucinum مایه‌زنی شدند و در ژرمناتور با دمای ۱۶ درجه سانتی‌گراد و رطوبت ۹۵٪ به مدت چهار هفته نگهداری شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل در سه تکرار با دو عامل گونه قارچ فوزاریوم و رقم سیب‌زمینی به اجرا درآمد. پس از سپری شدن زمان لازم برای توسعه بیماری شاخص بیماری، سطح آلودگی غده‌ها و رویش جوانه آن‌ها یادداشت‌برداری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که کلون‌های ۳97009-10، ۳9709713-397082-10، ۳97097-16 و رقم Agria با داشتن شاخص آلودگی پایین غده با جمع رتبه به میزان ۱۶۸/۵۲ تا ۲۲۸/۲ و سطح آلودگی کمتر در مقایسه با سایر کلون‌ها وارقام نسبت به جدایه‌های قارچی عامل بیماری پوسیدگی خشک مقاومت داشتند. از طرف دیگر کلون‌های ۳96124-15 و ۳96151-79 با بیشترین میزان شاخص بیماری و سطح آلودگی غده به عنوان کلون‌های حساس به بیماری شناخته شدند. بیماری بر رویش جوانه غده تاثیرگذار بود، به طوری که در کلون‌ها و رقم شاهد حساس رشد جوانه غده بسیار پایین بود.

واژه‌های کلیدی: سیب‌زمینی، کلون‌ها، Fusarium spp.، پوسیدگی خشک، مقاومت.

مقدمه

قرار گرفت و مشخص شد که با پیشرفت آلودگی در غدها فعالیت آنزیمی Polyphenol oxidase و Peroxidase شامل Lignin نیز ترکیباتی شامل Phytuberin، Lubimin، Chlorogenic acid Phytoberol Sesqueterpene Rishitin افزایش می‌یابد که برخی از آن‌ها در مقاومت ارقام به بیماری نقش دارند (Ray and Hammerschmidt, 1998).

تحقیقات نشان داده که جدایه‌های قارچی *F. sambucinum* در غدهای سیب‌زمینی تولید میکوتوكسین Diacetoxyscripenol می‌کنند که میزان این ماده در بافت‌های آلوده غده سیب‌زمینی همبستگی مثبت با شدت بیماریزائی جدایه‌های قارچی و حساسیت ارقام سیب‌زمینی دارد (Ellner, 2002). نتایج تحقیقات نشان دهنده عدم کارآیی قارچ‌کش‌ها به ویژه قارچ‌کش تیابندازول (ZBT) بر علیه این بیماری به دلیل غیر حساس شدن اغلب جدایه‌های قارچی عامل بیماری نسبت به آن بوده و مصرف آن موجب تشدید خسارت بیماری می‌شود (Hide et al., 1992; Lees et al., 1998; Desjardins et al., 1993؛ Bradshaw and Lees, 2001). در تحقیقی مقاومت به پوسیدگی خشک با عامل *F. sambucinum* در گونه‌های زراعی و وحشی سیب‌زمینی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد مقاومت نسبتاً بالایی در ۹ رقم وجود داشت. در دورگ گیری بین ژنتیپ‌های

پوسیدگی خشک سیب‌زمینی از جمله بیماری‌های انباری سیب‌زمینی است که خسارت ناشی از آن در سیب‌زمینی بذری و خوراکی در انبار و طی حمل و نقل به بازار مصرف نسبت به سایر بیماری‌های پس از برداشت سیب‌زمینی بیشتر است (Jafarpour, 1989). این بیماری همچنین مهم‌ترین عامل پوسیدگی قطعه‌های بذری سیب‌زمینی پس از کاشت به شمار می‌رود. با توجه به خاکزی بودن عامل بیماری، اغلب در مزرعه و قبل از برداشت موجب بروز لکه‌های قهوه‌ای رنگ کوچکی در غدها شده و در انبار توسعه یافته و به صورت سطحی و داخلی موجب پوسیدگی غدها می‌شود. خسارت بیماری در مزرعه و در انبار اتفاق می‌افتد. همچنین در صورت آلودگی قطعه‌های بذری سیب‌زمینی به ویژه زمانی که سطوح بریده شده به طور مناسب التیام نیافته و چوب پنبه‌ای نشده باشند، گیاهچه‌های ضعیف و نامناسبی پدید آمده و در نهایت موجب بروز بد سبزی در مزرعه می‌شود. گونه‌های متعددی از جنس Fusarium موجب ایجاد بیماری می‌شوند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به *F. solani*, *F. oxysporum*, *sambucinum* var. *coeruleum* (Hooker, 2001) اشاره کرد. *F. avenaceum* در یک بررسی، واکنش غده سیب‌زمینی پس از آلودگی به پوسیدگی خشک فوزاریومی با عامل *Fusareum sambucinum* مورد بررسی

Saturna در یک گروه جداگانه قرار گرفت و نسبت به تمام گونه‌های فوزاریوم به کار رفته در این تحقیق مقاومت داشت. گونه *F. oxysporum* کمترین قدرت بیماریزایی را داشته و تقریباً نیمی از ارقام مورد بررسی نسبت به این گونه مقاومت داشتند (Nasr Esfahani, 2005).

در برنامه اصلاح ارقام سیب‌زمینی، مساله مقاومت به بیماری‌های مهم از جمله مهم‌ترین موارد جهت دستیابی به ارقام مناسب و قابل توصیه برای اغلب مناطق کشت است. در بین بیماری‌های سیب‌زمینی، بیماری پوسیدگی خشک به عنوان یک بیماری مهم خاکزی و انباری سیب‌زمینی که در اغلب مناطق کشت این محصول وجود دارد از اهمیت خاصی برخوردار است. از سوی دیگر عدم کارایی فارچ کش‌های رایج علیه گونه‌های عامل بیماری که غالباً منجر به پیدایش نژادهای مقاوم عامل بیماری می‌شوند، باعث شده که استفاده از ارقام مقاوم به عنوان یکی از راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از اثر مخرب این بیماری مورد توجه قرار گیرد. برای این منظور کلون‌های میانرس سیب‌زمینی که طول دوره رویش آن‌ها متناسب با فصل رویش اغلب مناطق کشت این محصول در کشور است و در آزمایش‌های سازگاری مشخص شده که در بین آن‌ها کلون‌های با عملکرد و ماده خشک بالا و مناسب برای تازه‌خوری و یا صنایع فراوری چیپس و خلال وجود دارد، در این تحقیق از نظر مقاومت به دو

حساس و مقاوم، و راثت‌پذیری مقاومت بسیار بالا بود لیکن حداقل در برخی گونه‌ها توسط آلل‌های مغلوب کنترل می‌شد (Lynch *et al.*, 2003). مقاومت به بیماری پوسیدگی خشک تحت کنترل مکانیسم‌های ژنتیکی غیر وابسته است که اصلاح برای مقاومت را مشکل می‌کند Corsini and Pavek, 1986)؛ Leach and Webb, 1981 (Wastie and Bradshaw, 1993).

در آزمایشی بیماریزایی جدایه‌های مختلف عامل پوسیدگی خشک سیب‌زمینی ناشی از *F. solani* و *F. sambucinum* سیب‌زمینی رقم کنک بررسی شد. قطر سطح آلدگی و عمق آلدگی در غده‌های سیب‌زمینی اندازه گیری شد و مشخص شد که بین میانگین قطر سطح آلدده و عمق آلدگی در غده‌های سیب‌زمینی ۶۷ درصد همبستگی وجود داشت (Burkhart *et al.*, 2005).

حساسیت ۴۳ رقم تجاری سیب‌زمینی نسبت به عامل پوسیدگی خشک ایجاد شده توسط سه گونه فوزاریوم شامل *F. sulphureum* و *F. oxysporum* و *F. solani* در اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد گونه *F. sulphureum* نسبت به دو گونه دیگر قدرت تهاجمی بیشتری داشت و مقاومت ارقام به هر یک از گونه‌ها به صورت مستقل از دیگر گونه‌ها بود. نتایج تجزیه خوش‌های ارقام را در شش گروه طبقه‌بندی کرد به طوری که رقم

غده تزریق شد. تعداد ۹ غده سیب زمینی از هر کلون با هریک از جدایه های عامل بیماری مایه زنی شد. در تیمار شاهد به جای سوسپانسیون قارچ از آب مقطر استریل برای مایه زنی استفاده شد.

پس از انجام مایه زنی، غده ها در ژرمیناتوری با دمای ۱۶ درجه سانتی گراد و رطوبت ۹۵٪ به مدت چهار هفته نگه داری شدند تا عامل بیماری فرصت کافی و شرایط محیطی لازم را برای ایجاد بیماری در غده های سیب زمینی داشته باشد (Leach and Webb, 1981). آزمایش به صورت فاکتوریل با دو فاکتور گونه قارچی عامل بیماری پوسیدگی خشک فوزاریوم و کلون سیب زمینی در سه تکرار و سه نمونه در هر تکرار به اجرا درآمد.

پس از سپری شدن زمان لازم برای توسعه بیماری، غده های کلون های سیب زمینی از ژرمیناتور خارج شده و صفات مربوط به بیماری به شرح ذیل در مورد آن ها یادداشت برداری شد.

برای ارزیابی میزان نفوذ ضایعه ناشی از بیماری به درون گوشت غده و بررسی تیپ آلودگی غده کلون های آزمایشی از سیستم نمره دهی ۱-۴ استفاده شد (Wiersma, 1977):
۱: عدم نفوذ قارچ عامل بیماری به داخل گوشت غده
۲: نفوذ چند میلی متری قارچ و محدود شدن آن با واکنش نکروتیک شدید در غده
۳: نفوذ نسبتاً عمیق قارچ ولی با محدود شدن

گونه شایع و خسارت زای مهم این بیماری از جنبه های مختلف بررسی شد.

مواد و روش ها

مواد آزمایشی مورد استفاده در این تحقیق شامل ۲۹ کلون میان رس سیب زمینی که در آزمایش های سازگاری در مناطق مختلف کشت بهاره سیب زمینی در کشور مورد بررسی قرار گرفته اند بود. در این تحقیق کلون های سیب زمینی بر اساس دستورالعمل (Value for Cultivation and Use) VCU نظر مقاومت به عوامل بیماری پوسیدگی خشک انباری سیب زمینی در مقایسه با ارقام رایج کشور شامل Agria و Marfona که برای فرنچ فرایز، آب پز و چند منظوره مناسب هستند و رقم شاهد حساس Lady Roseta که مناسب فراوری است مورد بررسی قرار گرفتند. پس از برداشت سیب زمینی کلون ها در آزمایش مزرعه ای و سپری شدن زمان لازم نگه داری در انبار جهت پوست گیری، تعداد ۱۸ غده سالم سیب زمینی از هر کلون انتخاب شده و توسط جدایه های عامل پوسیدگی خشک سیب زمینی شامل *F. sambacinum* و *F. solani* به طور مصنوعی در آزمایشگاه مایه زنی شدند. برای این منظور در دو قسمت راس و پاشنه غده یک زخم به عمق ۵ میلی متر ایجاد کرده و با استفاده از سمپلر ۱۰۰ میکرولیتر از سوسپانسیون اسپور قارچی جدایه های گونه های مزبور به میزان ۵×۱۰۴ اسپور در میلی لیتر به داخل زخم های

تیمارهای آزمایش در مورد صفات تیپ آلودگی و شاخص جوانه‌زنی غده‌ها به روش کروسکال والیس مورد آزمون قرار گرفته و برای مقایسه میانگین مجموع رتبه‌ها از روش غیر پارامتری توکی استفاده شد. همبستگی بین صفات مورد آزمایش از طریق روش رتبه‌ای Spearman انجام شد (Zar, 1996).

نتایج و بحث

تجزیه واریانس صفات مختلف آزمایش نشان‌دهنده تفاوت آماری معنی‌دار بین جدایه‌های قارچی *F. solani* و *F. sambacinum* در ایجاد بیماری در غده کلون‌های سیب‌زمینی در سطح احتمال ۱٪ بود (جدول ۱). همچنین بین کلون‌های میانرس سیب‌زمینی از نظر صفت سطح آلوده غده‌ها به پوسیدگی خشک فوزاریومی با عوامل *F. solani* و *F. sambacinum* در سطح ۱٪ اختلاف آماری معنی‌دار وجود داشت (جدول ۱).

مقایسه میانگین صفات مختلف نشان داد میزان سطح آلودگی غده در جدایه قارچی *F. sambacinum* بر حسب میلی‌مترمربع نسبت به جدایه *F. solani* در غده‌های سیب‌زمینی بالاتر بود (جدول ۲). یکی از شاخص‌های مهم در بررسی آلودگی ناشی از پوسیدگی خشک در غده کلون‌های سیب‌زمینی، برآوردن سطح آلوده غده‌ها است که نشان‌دهنده میزان پیشرفت آلودگی قارچی در غده است. نتایج بررسی این

رشد و گسترش پوسیدگی قارچی در غده با ایجاد ناحیه نکروتیک در اطراف محل پوسیدگی

۴: رشد نامحدود قارچ در داخل غده همچنین میزان سطح آلوده به بیماری به صورت درصد برآورد شد. به این ترتیب که شدت آلودگی غده کلون‌های آزمایشی، با اندازه‌گیری سطحی از غده که پوسیدگی خشک در آن ایجاد شده بود محاسبه شد. داده‌های به دست آمده از درصد آلودگی غده ها ابتدا تبدیل به \sin^{-1} شد و سپس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

به منظور تعیین اثر جدایه‌های قارچی عامل بیماری بر رشد جوانه‌های غده سیب‌زمینی، پس از اتمام دوره نگهداری غده‌های مایه‌زنی شده با عامل بیماری در ژرمیناتور، شاخص جوانه‌زنی بر اساس سیستم نمره‌دهی ۱-۵ به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت (Leach and Webb, 1981):

۱: عدم جوانه‌زنی غده

۲: نیش زدن چشم غده

۳: جوانه‌ها رشد یافته به طول ۵ میلی‌متر

۴: جوانه‌ها رشد یافته به طول ۱۲ میلی‌متر

۵: جوانه‌های به طول ۳۰ میلی‌متر و بزرگ‌تر داده‌های حاصل از این تحقیق در مورد صفت سطح آلودگی غده کلون‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SAS تجزیه و تحلیل آماری شدند و مقایسه میانگین‌ها با آزمون D.S.L.A. انجام شد.

جدول ۱- تجزیه واریانس سطح آلودگی غدها به بیماری پوسیدگی خشک در کلون‌های سیب‌زمینی پس از آلودگی با گونه‌های Fusarium

Table 1. Analysis of variance for dry rot area of tuber in potato clones after inoculation with Fusarium species

S.O.V.	منابع تغیرات	درجه آزادی df.	میانگین مربعات MS
Potato clones	کلون سیب زمینی	32	797.650**
Fungal species	گونه قارچی	1	92837.001**
Clone × species	کلون × گونه	32	488.249**
Error	خطا	132	94.155
Sampling error	خطای نمونه‌گیری	396	93.796

**: Significant at 1% probability level. **: معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد.

جدول ۲- مقایسه گونه‌های Fusarium از نظر ایجاد سطح آلوده غدها به پوسیدگی خشک در غده در کلون‌های سیب‌زمینی

Table 2. Comparison of Fusarium species for dry rot area of tubers in potato clones

Fusarium species	گونه‌های فوزاریوم	سطح آلودگی Infected area of tubers(mm^2)
<i>Fusarium sambucinum</i>		42.68
<i>Fusarium solani</i>		17.68
LSD 5%		1.57

میانگین ۵۶/۸۰ و ۴۸/۰۵ میلی‌متر مربع بود (جدول ۳).

در تحقیقی بررسی مقاومت کلون‌های سیب‌زمینی نسبت به جدایه مهاجم *F. sambacinum* نشان داد که در کلون‌های حساس به بیماری محل آلودگی به تدریج در تمامی جهات پیشروی می‌کند و بافت پریدرم روی لکه فورفته و چروکیده می‌شود و در همان زمان با خشک شدن بافت مرده زیرین محل آلودگی در گوشت غده، حلقه‌های متعدد مرکزی در سطح ظاهر می‌شود در حالی که در کلون‌های مقاوم تنها در اطراف محل آلودگی لکه کوچک نکروتیکی ظاهر می‌شود

صفت در کلون‌های مورد آزمایش نشان داد که کلون‌های ۳۹۷۰۰۹، ۳۹۷۰۰۷-۱۶، ۳۹۷۰۰۷-۳، ۳۹۷۰۷۴-۳ و ۳۹۷۰۷۴-۹ از نظر ایجاد سطح آلودگی و رقم Agria به ترتیب با میانگین سطح آلودگی ۱۲/۴۹، ۱۲/۴۴، ۱۴/۱۶ و ۱۶/۵۲ میلی‌متر مربع کمترین میزان را داشتند. همچنین سطح آلوده کلون‌های ۳۹۷۰۹۷-۲، ۳۹۷۰۹۷-۹، ۳۹۷۰۸۱-۴، ۳۹۷۰۸۲-۴، ۳۹۶۱۵۲-۲، ۳۹۷۰۸۲-۱۰، ۳۹۷۰۹۷-۱۳ و ۳۹۷۰۸۲-۲ نیز نسبت به سایر کلون‌های مورد بررسی در این تحقیق پایین تر بود. بیشترین میزان سطح آلوده غده در کلون‌های مورد بررسی مربوط به کلون‌های میانرس ۳۹۶۱۵۱-۱۵ و ۳۹۶۱۲۴-۷۹ با ۳۹۶۱۵۱-۲۹

جدول ۳- مقایسه میانگین سطح آلوده غده در کلون‌های سیب‌زمینی آلوده شده با جدایه گونه‌های Fusarium

Table 3. Comparison of means of potato clones for infected area on tubers caused by Fusarium species

ردیف No.	کلون سیب زمینی Potato clones	سطح آلودگی Infected area (mm ²)	ردیف No.	کلون سیب زمینی Potato clones	سطح آلودگی Infected area (mm ²)
1	397074-11	44.11	18	Lady Roseta	36.37
2	Agria	16.52	19	396136-1	29.58
3	396128-1	30.74	20	396124-79/396151-15	56.80
4	397081-4	22.24	21	397007-16	12.44
5	397082-2	23.60	22	994002-8	33.89
6	397082-4	20.13	23	397074-9	20.83
7	396157-15	36.94	24	397069-4	29.58
8	396156-6	35.13	25	396128-5	34.43
9	397009	12.49	26	397097-2	20.69
10	397097-13	23.74	27	397082-10	24.85
11	397045-13	23.05	28	396152-2	23.07
12	396151-14	33.61	29	397045-15	30.16
13	396151-29	48.05	30	397045-3	28.27
14	397074-12	32.91	31	396128-32	29.49
15	397009-6	22.49	32	Marfona	35.97
16	397074-3	14.16	33	Sante	23.88
17	396310-8	35.13			

کی دوی محاسبه شده صفات مزبور نیز در سطح نتایج آزمون کروسکال والیس صفات تیپ ۱٪ معنی‌دار بود (جدول ۴). نتایج حاصل از مقایسه میانگین ترکیب کلون سیب‌زمینی × جدایه فوزاریوم از نظر تیپ آلودگی پوسیدگی سیب‌زمینی در شرایط آلودگی نشان داد که (Vitale *et al.*, 2004).

جدول ۴- آزمون کروسکال والیس برای صفات تیپ آلودگی و رویش جوانه غدها در سیب زمینی
Table 4. Kruskal Wallis test for disease index and sprout growth in potato tubers

Trait	صفت	درجه آزادی df.	کی دوی محاسبه شده Chi-Square
Disease index	تیپ آلودگی	65	355.46**
Sprout growth	رویش جوانه	65	369.85**

**: Significant at 1% probability level.

**: معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد.

کاهش انداخته غذایی آن ایجاد می شود. و در صورتی که غدها به عنوان بذر در مزرعه کشت شوند این مساله منجر به بد سبزی در مزرعه خواهد شد در طی این تحقیق اثر عامل بیماری در ایجاد اختلال در رشد جوانه غدها کلون های سیب زمینی پس از دوره نگهداری غدها در ژرمنیاتور مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج بررسی صفت رشد جوانه غده در تیمارهای آزمایش نشان داد که میانگین جمع رتبه رشد جوانه ۳۹۷۰۰۹-۳، ۳۹۷۰۸۱-۴، ۳۹۷۰۴۵-۳، ۳۹۷۰۸۲-۴، ۳۹۷۰۹۷-۲، Agria و ۳۹۶۱۵۷-۱۵ مایه زنی شده با جدایه مهاجم *F. sambacinum* با میانگین ۳۶۸/۶۶ و ۳۶۲/۲۷، ۳۷۱/۸۳ بیش از سایر کلون ها بود. برخی از تیمارهای آزمایش شامل کلون های ۳۹۷۰۹۷-۲، ۳۹۷۰۰۷/۱۶، ۳۹۷۰۷۴-۳ و ۳۹۷۰۰۹-۶ مایه زنی شده با هر دو جدایه فوزاریومی، علی رغم داشتن شاخص آلودگی و سطح آلودگی پایین غدها ولی به دلیل دوره طولانی خواب غده چینی کلون هایی، میزان رشد جوانه ها در آن ها نسبتاً پایین بود.

خشک قارچی تیمارهای آزمایش به روش آزمون غیر پارامتری توکی نشان داد که میانگین جمع رتبه صفت تیپ آلودگی کلون های ۳۹۷۰۰۹، ۳۹۷۰۹۷-۲، ۳۹۷۰۹۷-۱۰، ۳۹۷۰۴۵-۱۵ و ۳۹۷۰۶۹-۴ گونه قارچی فوزاریوم به ترتیب با ۱۶۸/۵۲، ۲۸۰/۴۷ و ۲۶۸/۳۸، ۲۴۲/۳۸، ۲۳۳/۰۲ و ۲۳۳/۰۲ کمترین میزان را در بین کلون های آزمایش داشتند. از طرف دیگر کلون های ۳۹۶۱۵۱-۲۹، ۳۹۶۱۲۴-۷۹ × ۳۹۶۱۵۱-۱۵، ۳۹۶۱۳۶-۱ و ۳۹۶۳۱۰-۸ به ترتیب با جمع رتبه ۴۶۵/۸۸، ۳۹۹/۷۱، ۴۲۲/۸، ۳۶۶/۶۳، ۳۳۷/۲۷ و ۳۳۷/۲۷ بالاترین میزان را در بین سایر کلون های سیب زمینی داشتند و تیپ آلودگی آن ها حتی از شاهدهای حساس آزمایش (ارقام Marfona و Lady Roseta) بیشتر بود (جدول ۵).

اثر مهم عامل بیماری عامل بیماری پوسیدگی خشک در غدهای بذری سیب زمینی توقف یا کاهش رشد جوانه های غدها است که به دنبال بروز پوسیدگی در بافت غده و

جدول ۵- مقایسه ترکیب کلون‌های سیب‌زمینی × جدایه‌های Fusarium از نظر میانگین شاخص بیماری
Table 5. Comparison of potato clones×Fusarium isolate combinations for mean disease index

Potato clone × <i>F. solani</i>	جمع رتبه میانگین Total mean	Potato clone × <i>F. sambacinum</i>	جمع رتبه میانگین Total mean
397074-11	89.66	397074-11	447.16
Agria	161.22	Agria	294.83
396128-1	161.22	396128-1	484.61
397081-4	161.22	397081-4	362.27
397082-2	218.67	397082-2	399.72
397082-4	218.67	397082-4	304.83
396157-15	161.22	396157-15	447.16
396156-6	218.67	396156-6	428.44
397009	118.38	397009	218.67
397097-13	161.22	397097-13	276.11
397045-13	132.50	397045-13	428.44
396151-14	304.83	396151-14	391.00
396151-29	304.83	396151-29	540.77
397074-12	161.22	397074-12	409.72
397009-6	161.22	397009-6	399.72
397074-3	175.66	397074-3	247.38
396310-8	304.83	396310-8	428.44
Lady Roseta	304.83	Lady Roseta	465.88
396136-1	352.27	396136-1	447.16
396124-79/396151-15	409.72	396124-79/396151-15	522.05
397007-16	161.22	397007-16	294.83
994002-8	189.94	994002-8	484.61
397074-9	247.38	397074-9	304.83
397069-4	132.50	397069-4	352.27
396128-5	218.67	396128-5	409.72
397097-2	132.50	397097-2	333.55
397082-10	132.50	397082-10	333.55
396152-2	161.22	396152-2	362.27
397045-15	132.50	397045-15	428.44
397045-3	189.94	397045-3	484.61
396128-32	189.94	396128-32	391.00
Marfona	276.11	Marfona	465.88
Sante	247.38	Sante	371.00
TUKEY		444.5	

جوانه‌زنی کلون‌ها همبستگی منفی و معنی‌دار در سطح ۵٪ وجود دارد همبستگی بین شاخص آلودگی و سطح آلودگی مثبت بوده و در سطح احتمال ۱٪ معنی‌دار شد (جدول ۷). با توجه به این که تیپ آلودگی در واقع معیاری از میزان نفوذ قارچ عامل بیماری و ایجاد پوسیدگی در درون بافت غده است و سطح آلوده غده‌ها میزان گسترش پوسیدگی غده را نشان می‌دهد چنین استباط می‌شود که هر چقدر بافت غده

میانگین جمع رتبه شاخص جوانه‌زنی کلون‌های میانرس ۳۹۶۱۵۱-۱۵ × ۳۹۶۱۲۴-۷۹ و ۳۹۶۱۳۶-۱-۳۹۶۱۲۸-۳۲ و ۳۹۶۳۱۰-۸ ترتیب ۴۹/۹۴، ۸۲/۴۴، ۹۶/۸۳ و ۱۱۷/۶۱ بود که در مقایسه با سایر کلون‌ها و رقم حساس Lady Roseta پایین‌تر بود (جدول ۶). همبستگی صفات در این تحقیق نشان داد که بین صفات شاخص آلودگی و شاخص جوانه‌زنی همچنین بین سطح آلودگی و شاخص

جدول ۶- مقایسه ترکیب کلون‌های سیب‌زمینی × جدایه‌های Fusarium از نظر میانگین میزان رشد جوانه در شرایط آسودگی

Table 6. Comparison of potato clones × Fusarium isolate combinations for sprout growth

Potato clone × <i>F. solani</i>	جمع رتبه میانگین Total mean	Potato clone × <i>F. sambacinum</i>	جمع رتبه میانگین Total mean
397074-11	561.50	397074-11	235.88
Agria	498.27	Agria	371.83
396128-1	561.50	396128-1	197.55
397081-4	533.50	397081-4	424.66
397082-2	561.50	397082-2	215.11
397082-4	514.83	397082-4	371.83
396157-15	533.50	396157-15	368.66
396156-6	533.50	396156-6	194.33
397009	561.50	397009	371.38
397097-13	179.94	397097-13	141.05
397045-13	256.66	397045-13	291.88
396151-14	161.83	396151-14	191.66
396151-29	241.77	396151-29	215.11
397074-12	150.11	397074-12	126.66
397009-6	274.44	397009-6	297.77
397074-3	241.77	397074-3	351.05
396310-8	194.33	396310-8	82.44
Lady Roseta	194.33	Lady Roseta	194.33
396136-1	295.05	396136-1	117.61
396124-79/396151-15	182.61	396124-79/396151-15	49.94
397007-16	117.61	397007-16	274.27
994002-8	221.00	994002-8	347.88
397074-9	224.16	397074-9	318.55
397069-4	442.27	397069-4	274.27
396128-5	295.05	396128-5	235.88
397097-2	224.16	397097-2	371.83
397082-10	424.66	397082-10	197.55
396152-2	333.44	396152-2	371.83
397045-15	295.05	397045-15	256.22
397045-3	262.55	397045-3	416.38
396128-32	322.00	396128-32	96.83
Marfona	274.27	Marfona	256.66
Sante	442.27	Sante	295.05
TUKEY		468.7	

آلودگی غده‌ها ییشترين تاثير را در رشد جوانه‌های غده دارد (جدول ۷). نتایج تحقیقات لیچ و وب (Leach and Webb, 1981) در این زمینه نشان داد که بین مقاومت کلون‌های سیب‌زمینی به گونه‌های مختلف عامل بیماری فوزاریوم و جوانه‌زنی غده‌ها همبستگی وجود نداشت لیکن کلون‌های مقاوم یا نسبتاً مقاوم به

مورد هجوم بیشتر قرار گرفته و ضایعه پوسیدگی در آن بیشتر باشد علاوه بر کاهش سطح موثر غده جهت جوانه‌زنی، میزان مواد غذایی جهت جوانه‌زنی و رشد جوانه‌ها کمتر شده و از این رو شاخص جوانه‌زنی در غده‌ها کاهش می‌یابد. همچنان که نتایج حاصل از همبستگی صفات در این تحقیق نیز نشان داد، شاخص

جدول ۷- ضرایب همبستگی بین صفات کلون‌های سیب‌زمینی پس از انجام آلودگی مصنوعی با جدایه‌های Fusarium عامل بیماری پوسیدگی خشک

Table 7. Correlation coefficients between different traits of potato clones after inoculation with *Fusarium* species causing potato dry rot

صفات Traits	شاخص بیماری Disease index	سطح آلودگی غده Infected area of tubers	شاخص جوانه‌زنی غده Sprout growth
Disease index			
Infected area	0.725 **		
Sprout growth	- 0.382 *	- 0.347 *	

** و * : به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد و ۵ درصد.

** and * : Significant at 1% and 5% probability levels, respectively.

در ضمن طی بررسی مزرعه‌ای آزمایش‌های سازگاری در مناطق مختلف از بین کلون‌های مزبور که مقاومت بالایی به بیماری پوسیدگی خشک نشان دادند، کلون‌های ۳۹۷۰۹۷-۲ و ۳۹۷۰۸۲-۱۰ با دارا بودن عملکرد بالا به ترتیب به میزان ۲۷٪، ۱۵٪ بیش از رقم تجاری Agria و نیز ماده خشک بالا به ترتیب به میزان ۲۲/۵ و ۲۰/۲ درصد، برای مصارف تازه‌خوری و صنایع فراوری مناسب شناسائی شدند.

بیماری شاخص جوانه‌زنی بالاتری نسبت به کلون‌های حساس داشتند.

به طور کلی نتایج حاصل از تحقیق، مقاومت نسبی کلون‌های ۳۹۷۰۹۷۱۳، ۳۹۷۰۰۹، ۳۹۷۰۰۷-۱۶، ۳۹۷۰۹۷-۲، ۳۹۷۰۸۲-۱۰، ۳۹۷۰۷۴-۳ و رقم Agria با داشتن شاخص آلودگی پایین غده و سطح آلودگی کم در مقایسه با سایر کلون‌ها و ارقام مورد بررسی نسبت به جدایه‌های *F. sambacinum* و *F. solani* عامل پوسیدگی خشک را نشان داد.

References

- Burkhart, C., Christ, B., and Haynes, K. 2005.** The relative virulence of various isolates of *Fusarium* species on potato. *Phytopathology* 95: 6 (Suppl.).
- Corsini, D., and Pavek, J. J. 1986.** Fusarium dry rot resistant potato germplasm. *American Potato Journal* 63: 629-638.
- Desjardins, A. E., Christ-Harned, E. A., McCormick, S. P., and Secor, G. A. 1993.** Population structure and genetic analysis of field resistance to thiabendazole in *Gibberella pulicaris* from potato tubers. *Phytopathology* 83: 164-170.

- Ellner, F. M. 2002.** Mycotoxins in potato tubers infected by *Fusarium sambucinum*. Mycotoxin Research 18:57-61.
- Hide, G. A., Read, P. J., and Hall, S. M. 1992.** Resistance to thiabendazole in *Fusarium* species isolated from tubers affected by dry rot. Plant Pathology 41: 745-748.
- Hooker,W. J. 2001.** Compendium of Potato Diseases. American Phytopathological Society, St. Paul, Minnesota, USA.
- Jafarpoor, B. 1989.** Potato Diseases. Univesity of Mashhad Publisher, Mashhad, Iran (in Persian).
- Leach, S. S., and Webb, R. W. 1981.** Resistance of selected potato cultivars and clones to fusarium dry rot. Phytopathology 71: 623-629.
- Lees, A. K., Bradshaw, J. E., and Hellene, S. 1998.** Inheritance of resistance to *Fusarium* spp. and to *Phytophthora infestans* in crosses between Neotuberosum and Tuberosum potatoes estimated by seedling tests. Potato Research 41: 267-275.
- Lynch, L., Kawchuk, M., Chen, Q., and Kokko, M. 2003.** Resistance to *Fusarium sambucinum* in wild and cultivated solanum species. American Journal of Potato Research 80: 353-358.
- Nasr Esfahani, M. 2005.** Susceptibility assessment of potato cultivars to fusarium dry rot species. Potato Research 48: 215-226.
- Ray, H., and Hammerschmidt, R. 1998.** Responses of potato tuber to infection by *Fusarium sambucinum*. Physiological and Molecular Plant Pathology 53: 81-92.
- Vitale, S., Alberino, S., Zonia, A., Parisi,B., and Corazza, D. 2004.** Evaluation of resistance to dry rot and soft rot of potato clones adapted to Mediterranean regions. Phytopathol. Pol. 34: 13-20.
- Wastie, R. L., and Bradshaw, J. E. 1993.** Inheritance of resistance to *Fusarium* spp. in tuber progenies of potato. Potato Research 36: 189-193.
- Wiersma, H. T. 1977.** Laboratory testing for the resistance of potato tubers to dry rot(*Fusarium coreleum*). Potato Research 20: 268-269.
- Zar, J. H. 1996.** Biostatistical Analysis. Printice Hall International Inc., London, UK. 662 pp.