

## ارزیابی پارامترهای ژنتیکی صفات مهم زراعی کنجد در شرایط آبیاری و محدودیت آبی با استفاده از روش دی‌آلل کراس

### Evaluation of Genetic Parameters of Important Agronomic Traits of Sesame in Irrigated and Water-Limited Conditions using Diallel Cross Method

سعده‌الله منصوری

مریم پژوهش، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۵/۱۰ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۹/۲۱

#### چکیده

منصوری، م. ۱۳۹۵. ارزیابی پارامترهای ژنتیکی صفات مهم زراعی کنجد در شرایط آبیاری و محدودیت آبی با استفاده از روش دی‌آلل کراس. مجله بهنژادی نهال و بذر ۱، ۳۲-۳، ۴۰۱-۴۲۰: ۱۰.22092/spij.2016.113066.

در این بررسی، از روش دای‌آلل کراس یک طرفه، روش ۲ گریفینگ و مدل مخلوط B برای ارزیابی پارامترهای ژنتیکی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک هفت لاین کنجد و ۲۱ توده F2 آن‌ها در شرایط آبیاری و محدودیت آبی استفاده شد. بر اساس نسبت میانگین ترکیب‌پذیری عمومی به خصوصی در شرایط آبیاری، کنترل صفات تعداد روز تا آغاز گل‌دهی، تعداد روز تا پایان گل‌دهی، تعداد روز تا رسیدگی، تعداد کپسول در شاخه اصلی، وزن هزار دانه، عملکرد شاخه اصلی، طول کپسول، طول میان گره، تعداد گره غیر زاینده کپسول، تعداد گره زاینده کپسول و تعداد کل گره تحت تاثیر اثر افزایشی ژن‌ها، برخی صفات تحت تاثیر اثر غیر افزایشی ژن‌ها و برخی دیگر تحت تاثیر صفات ترکیب متوازنی از این دو اثر بود. مقادیر وراثت‌پذیری عمومی از ۵۸/۴ درصد برای طول میان گره تا ۹۷/۷ درصد برای تعداد کپسول در بوته متغیر بود. ارزیابی وراثت‌پذیری خصوصی نشان‌دهنده مقادیر بالای این شاخص برای صفات تعداد کپسول در شاخه اصلی با ۸۲/۵ درصد و روز تا رسیدگی با ۸۰/۵ درصد بود که حاکی از بازده بالای انتخاب برای این صفات بود. در شرایط محدودیت آبی در تمام صفات، اثر غیر افزایشی ژن‌ها نقش بیشتری داشت. وراثت‌پذیری عمومی صفات در این شرایط تغییر محسوسی نسبت به شرایط آبیاری نداشت، اما برآوردهای وراثت‌پذیری خصوصی در شرایط محدودیت آبی نسبت به آبیاری دچار کاهش شد که یانگر احتمال کندی پیشرفت برنامه‌های بهنژادی است.

واژه‌های کلیدی: کنجد، عملکرد، دی‌آلل کراس، وراثت‌پذیری عمومی، وراثت‌پذیری خصوصی.

## مقدمه

ژنتیکی دارای پیچیدگی بسیار کمتری هستند می‌تواند به عنوان معیار گزینش در شرایط محیطی مختلف مدنظر قرار گیرد (Eack, 1996). به منظور اصلاح ژنتیکی مقاومت به خشکی در گیاهان زراعی، مهم‌ترین قدم انتخاب والدین مناسب، وارد کردن صفات مطلوب در یک زمینه ژنتیکی سازگار و به وجود آوردن تیپ‌های ایده‌آل گیاهی است (Acevedo and Ceccarelli, 1989; Bushuk *et al.*, 1989; Tabanao and Bernardo, 2005). کنجد به برنامه بهنژادی یک رقم زراعی ایجاد جمعیتی است که از نظر صفات زراعی دارای تنوع ژنتیکی مناسب باشد (Ashri, 1998; Ahmadi *et al.*, 2001; Ahmadi, 1990). پارامترهای ژنتیکی و ترکیب پذیری عمومی و خصوصی را می‌توان با تجزیه دی‌آلل برآورد کرد (Verhalen and Murray, 1967). با بررسی شش نسل از دو تلاقی، آبناندان و همکاران (Anbanandan *et al.*, 2006) اعلام کردند که اغلب صفات مهم موثر در عملکرد و نیز صفت عملکرد عمده‌تاً تحت کنترل اثر غالیت ژن و سپس اثر متقابل افراشی × غالیت بودند.

بررسی ارقام رایج و معرفی شده کنونی گیاهان زراعی نشان می‌دهد که بیشترین پیشرفت‌های تحقیقاتی آن‌ها در مناطق بومی و مراکز اولیه صورت انجام شده است. کنجد به عنوان گیاه روغنی بومی کشورمان با برخورداری از ویژگی‌های برجسته متعدد نظیر میزان روغن بالا با کیفیت عالی، مقاومت نسبی به کم آبی و نیز دامنه سازگاری وسیع، جایگاه ویژه‌ای را در کشاورزی به خود اختصاص داده است. سطح کشت کنجد در جهان بر اساس آمار منتشره سازمان خواربار جهانی در سال ۲۰۱۳ حدود ۴۰۰ هزار هکتار و میزان تولید دانه آن بیش از ۴/۷۵ میلیون تن برآورد شده است (Anonymous, 2014). متوسط عملکرد جهانی آن برابر ۵۰۶ کیلوگرم در هکتار بوده و در کشور ما حدود ۷۰۰ کیلوگرم در هکتار برآورد می‌شود. در حال حاضر سطح زیر کشت کنجد در ایران بین ۴۰ تا ۵۰ هزار هکتار است. با توجه به محدودیت‌ها در منابع آبی و خصوصیات ویژه کنجد در شرایط کم آبی، انتظار به گسترش کشت این گیاه وجود دارد. از طرفی اثر تنفس خشکی و نیز واکنش گیاه به خشکی در سطح کل گیاه بسیار پیچیده است زیرا ترکیبی از اثرباره‌های تنفس و پاسخ به آن را در تمام سازمان گیاه در شرایط مختلف وجود دارد (Belhassen, 1997). ارزیابی صفات مورفو‌لوزیک مرتبط با عملکرد دانه که از نظر

تک بوته و طول کپسول اعلام داشتند. در یک برنامه به نژادی بین لاین‌های شکوفا و ناشکوفا دورگ‌گیری انجام شد و ارقام ناشکوفا به نام پالمیتو و ریبو به دست آمدند (Langham and Weimers, 2002). مورتی (Murty, 1998) و آشری (Ashri, 1975) صمن انجام یک بررسی دی‌آلل اثر متقابل والدینی را برای صفات تعداد روز تا گل‌دهی، ارتفاع گیاه، تعداد شاخه اولیه، تعداد شاخه ثانویه و تعداد کپسول در بوته معنی‌دار اعلام کرد و برای صفات عملکرد دانه، درصد روغن و درصد پروتئین فاقد اثر معنی‌دار نبود. اثر معکوس در دورگ‌های بین ارقام داخلی و خارجی بیشتر بود. قابلیت ترکیب‌پذیری بعضی از صفات فیزیولوژیکی کنجد را بانرجی و کول (Banerjee and Kole, 2009) با هدف شناسایی نوع عمل ژن‌ها و شناسایی والدین در برنامه‌های به نژادی با استفاده از هفت والد و ۲۱ نتاج مربوطه در قالب یک طرح دی‌آلل یک طرفه بررسی کردند. بنابر گزارش آن‌ها واریانس ترکیب‌پذیری عمومی (GCA) و ترکیب‌پذیری خصوصی (SCA) معنی‌دار و بیانگر اهمیت اثر افزایشی و غیر افزایشی ژن‌ها بود، به علاوه برای صفت درصد روغن اثر افزایشی ژن‌ها و برای صفت عملکرد روغن اثر غیرافزایشی ژن‌ها دارای نقش عمدی بود. در بررسی‌هایی که ساکیلا و همکاران (Sakila et al., 2000) برای صفات کمی کنجد انجام دادند، اعلام شد که منصوری و احمدی (Mansouri and Ahmadi, 1997) از هفت لاین ورقه کنجد به اسمی داراب ۱۴، پاناما، ورامین ۲۸۲۲، ناز تک شاخه، کرج ۲۹ مقاوم به ریزش و ناز چند شاخه، در یک طرح دی‌آلل کراس یک طرفه  $7 \times 7$  ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی را برای صفات ارتفاع بوته، تعداد کپسول در بوته، وزن هزاردانه، عملکرد تک بوته و درصد روغن بررسی و گزارش دادند در مورد صفات یاد شده، به غیر از وزن هزاردانه، بیشترین سهم واریانس ژنتیکی به واریانس افزایشی اختصاص داشت. نوع اثر ژن‌ها برای صفات ارتفاع گیاه، تعداد شاخه فرعی در گیاه، تعداد کپسول در گیاه، وزن هزاردانه و عملکرد در بوته و مقاومت به بیماری‌های عمدی کنجد شامل (پژمردگی فوزاریومی و آلتوناریا) توسط ال براموی و شعبان (El-Bramawy and Shaban, 2007) در یک طرح دی‌آلل یک طرفه شش والدی بررسی و نتایج نشان دادند که واریانس غیرافزایشی برای همه صفات غیر از صفات تعداد روز تا رسیدگی و تحمل به آلتوناریا دارای نقش عمدی بود. کومار و همکاران (Kumar et al., 2012) با انجام یک بررسی دی‌آلل یک طرفه روی ده والد موتانت کنجد نقش بیشتر اثر افزایشی ژن در کنترل صفت ارتفاع بوته را گزارش کردند و متقابلاً نقش اثر غیر افزایشی ژن را در بروز صفات تعداد دانه در کپسول، وزن هزاردانه، تعداد کپسول در بوته، درصد روغن، عملکرد

کپسول در شاخه‌ها و تعداد کپسول در گیاه به منظور جدا کردن و شناسایی ژنوتیپ‌های پرمحصول در جمعیت‌های درحال تفرق به دلیل سهم عمدۀ واریانس افزایشی ژن‌ها در آن‌ها مفید بوده و قابل توصیه است. تسعیکی و وراثت‌پذیری عملکرد دانه و اجزاء آن در کنجد راسولانکی و پالیوال (Solanki and Paliwal., 1981) بررسی و واریانس فنوتیپی و ژنوتیپی بالایی را برای صفات تعداد کپسول در بوته و تعداد دانه در کپسول تعیین کردند. در این مطالعه وراثت‌پذیری بالا برای صفت وزن هزار دانه، طول کپسول، تعداد دانه در کپسول و تعداد روز تا رسیدن به دست آمد ولی میزان وراثت‌پذیری عملکرد دانه در بوته و تعداد کپسول در بوته از حد متوسط فراتر نرفت. بررسی‌هایی که میشرا و یاداو (Mishra and Yadav., 1997) با استفاده از ۲۸ ژنوتیپ نسل F1 و ۲۸ ژنوتیپ نسل F2 برای صفت عملکرد و اجزاء آن انجام دادند، نشان داد که انتخاب غیر مستقیم برای کپسول‌دهی، تعداد کپسول در شاخه‌ها و تعداد کپسول در گیاه به منظور جدا کردن و شناسایی ژنوتیپ‌های پرمحصول در جمعیت‌های درحال تفرق به دلیل سهم عمدۀ واریانس افزایشی ژن‌ها در آن‌ها قابل توصیه است. میشرا و یاداو (1996) اهمیت عمل افزایشی ژن را برای صفت وزن هزار دانه اعلام کردند ولی پادماواتی (Padmavathi, 1999) نوع عمل غیر افزایشی را مهم‌تر دانست. خورگاده و همکاران

تلaci‌های VR-1 × Si250 برای صفات روز تا گل‌دهی و ارتفاع بوته و TMV5 × Si3315/11 برای صفات تعداد کپسول و عملکرد تک بوته می‌توانند منشاء ارقام برتر واقع شوند. در بررسی‌هایی که توسط مانوهاران و همکاران (Manoharan *et al.*, 1989) واریانس‌های ترکیب‌پذیری خصوصی برای صفات ارتفاع بوته و عملکرد دانه بیشتر از واریانس‌های ترکیب‌پذیری عمومی بوده و نشان‌دهنده آن بود که نوع غیر افزایشی عمل ژن‌ها این صفات را کنترل می‌کند. ساکیلا و همکاران (2000) اعلام کردند که کنترل صفات روز تا گل‌دهی، ارتفاع گیاه، تعداد شاخه فرعی، ارتفاع اولین کپسول، تعداد کپسول و عملکرد تک بوته با اثر غیر افزایشی است. در بررسی‌هایی که میشرا و یاداو (Mishra and Yadav, 1997) با استفاده از ۲۸ ژنوتیپ نسل F1 و ۲۸ ژنوتیپ نسل F2 برای صفت عملکرد و اجزاء آن انجام دادند وراثت‌پذیری بالا برای صفات عملکرد دانه در بوته، تعداد کپسول در شاخه‌ها، تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول و وزن هزار دانه و وراثت‌پذیری متوسط برای صفات تعداد روز تا ۵۰ درصد گل‌دهی، تعداد روز تا بلوغ و میزان روغن گزارش شد. بر این اساس صفات تعداد شاخه در بوته، تعداد گره‌های دارای کپسول در بوته و تعداد کپسول در شاخه اصلی دارای وراثت‌پذیری پایین بودند. این نتایج نشان داد که انتخاب غیر مستقیم برای کپسول‌دهی، تعداد

در کرج با عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۴۹ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۶ دقیقه شرقی و ارتفاع ۱۳۲۱ متر سطح دریا انجام شد. از آن‌جا که انتخاب والدین و تهیه مواد ژنتیکی لازم، از فعالیت‌های اساسی برای این پژوهش بود، در سال ۱۳۸۸ با استفاده از دورگ‌گیری براساس الگوی دی‌آلل بین ارقام ولین‌های اولتان، داراب ۱، ورامین ۲۸۲۲، دشتستان ۲، کرج ۱، زودرس فلسطینی و TLHE که دارای تنوع کافی از نظر تحمل به شرایط کم آبی بوده و از ارقام، لاین‌ها و ژرم‌پلاسم مورد توجه در فرایند اصلاحی این گیاه هستند، بذرهای F1 به دست آمد. در والدین مذکور ارقام داراب ۱ و اولتان به عنوان ارقام متحمل به شرایط کم آبی و لاین‌های کرج ۱ و زودرس فلسطینی از نظر تحمل در شرایط یاد شده با دو رقم داراب ۱ و اولتان دارای تفاوت بارز و اساسی هستند. سه ژنوتیپ دیگر از نظر صفات اصلاحی کنجد مورد توجه بوده و از نظر تحمل یا حساسیت به شرایط کم آبی در وضعيت بینایین هستند. با توجه به ماهیت بررسی در سال ۱۳۸۹ برای به دست آوردن بذر کافی ضمن یک نسل خودگشتنی بذرهای F2 تهیه و در سال ۱۳۹۰ پژوهش حاضر انجام شد. برای کاشت، در هر کرت سه خط چهار متری در نظر گرفته شد. بذرهای دورگ (F2) به دست آمده به تعداد ۲۱ ترکیب و هفت والد مربوطه مجموعاً ۲۸ تیمار بذری در قالب دو طرح بلوک‌های کامل تصادفی سه تکراری جداگانه در

(Khorgade *et al.*, 1989) اعلام کردند هر دو نوع افزایشی و غیر افزایشی عمل ژن در کنترل این صفت اهمیت دارد. طبقه‌بندی مقدار وراثت‌پذیری توسط جانسون و همکاران (Johnson *et al.*, 1955) انجام شد. بر اساس نظر آن‌ها وراثت‌پذیری کمتر از ۳۰ درصد در گروه وراثت‌پذیری کم (پائین)، وراثت‌پذیری بین ۳۰ تا ۶۰ درصد در گروه وراثت‌پذیری متوسط و بیشتر از ۶۰ درصد در گروه وراثت‌پذیری بالا قرار می‌گیرد. با استفاده از هفت رقم والدی کنجد و ۲۱ دورگ آن‌ها موتیلال و مانوهاران (Mothilal and Manoharan, 2005) پارامترهای ژنتیکی متفاوت را بررسی کردند. برآوردهای بالا برای وراثت‌پذیری صفات ارتفاع گیاه و تعداد شاخه در گیاه نشان داد که امکان تثیت یا پایداری این صفات از طریق اصلاح شجره‌ای وجود دارد. عمل غیر افزایشی ژن برای صفاتی شامل تعداد کپسول در شاخه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در گیاه اعلام شد. بررسی حاضر با هدف ارزیابی پارامترهای ژنتیکی با توجه به تعداد زیاد صفات در دو شرایط زیستی کاملاً مختلف در گیاه کنجد انجام شد.

## مواد و روش‌ها

این پژوهش از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ در مدت سه سال در مزرعه چهارصد هکتاری وابسته به موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر واقع

کپسول، طول میان گره، تعداد گره غیر زاینده کپسول، تعداد گره زاینده کپسول و تعداد کل گره یادداشت برداری انجام شد. از آنجا که عملکرد گیاه بیشتر تابع عملکرد شاخه اصلی است و برخی عوامل محیطی در تعداد شاخه فرعی اثرگذار است، برای دقت بیشتر در آزمایش، در یادداشت برداری‌ها شاخه اصلی مورد نظر قرار گرفت. در اندازه گیری صفات با توجه به ماهیت مواد ژنتیکی وجود تنوع وغیریکنواختی در توده‌های F2 مربوطه برای یادداشت برداری صفات از میانگین ده بوته انتخابی تصادفی در تمامی مراحل فنلوزیکی در هر کرت استفاده شد و پس از برداشت نیز سایر صفات مربوط به بوته‌های یاد شده از قبیل عملکرد وزن هزار دانه اندازه گیری شد. پس از جمع آوری کلیه داده‌های اندازه گیری شده محاسبات و تجزیه‌های دی‌آلل براساس روش دو گریفینگ (Griffing, 1956 a,b) و مدل Mخلوط B با استفاده از نرم‌افزارهای Excel و Diallel انجام شد. با توجه به استفاده از توده‌های دورگ (F2)، ضریب اینبریدینگ معادل یک دوم منظور شد و فرمول‌های  $V_{D} = \frac{8}{9} \sigma^2$  Gca و  $V_A = \frac{8}{9} \sigma^2 Sca$  برآورد واریانس افزایشی و غالیت مورد استفاده قرار گرفتند.

### نتایج و بحث

تجزیه واریانس صفات در شرایط آبیاری و محدودیت آبی به ترتیب در جدول‌های ۱ و ۲

۲۲ خرداد کاشت شدند. تمامی عملیات زراعی تا زمان استقرار گیاه در ارتفاع ۱۵ الی ۲۵ سانتی‌متری به صورت کاملاً یکنواخت و یکسان انجام شد و از اول مرداد ماه یعنی تقریباً چهل روز پس از کاشت در مرحله‌ای که گیاه در زمین استقرار یافته و بیشتر عملیات زراعی نیز انجام شده بود، برای ایجاد شرایط محدودیت آبی دو رژیم آبیاری متفاوت در نظر گرفته شد: (الف) از این مرحله دریکی از آزمایش‌ها به عنوان آزمایش نرمال (شاهد)، آبیاری تا زمان برداشت ادامه یافت و براساس تشکیک تبخیر کلاس A در تبخیر ۸۵-۷۰ میلی متر در زمان خود و در ۴-۵ نوبت انجام شد.

(ب) در آزمایش دیگر شرایط محدودیت آبی با قطع آبیاری ایجاد شد. در شرایط ایجاد شده تا زمان انجام اولین برداشت برای ارقام زودرس، ۲۲۰-۲۱۰ میلی متر تبخیر و در آخرین زمان برداشت برای ارقام دیسررس ۳۲۰-۳۰۰ میلی متر تبخیر اندازه گیری و ثبت شد. در هر دو رژیم آبیاری از ابتدای طول دوره رویشی، یعنی زمان سبز کردن از صفت جوانه‌زنی یادداشت برداری به عمل آمد و تا پایان فصل در صفات معتقد از قبیل تعداد روز تا آغاز گلدهی، تعداد روز تا پایان گلدهی، تعداد روز گلدهی، تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع شاخه اصلی، تعداد کپسول در شاخه اصلی، ارتفاع اولین کپسول، ارتفاع شاخه زاینده، قطر شاخه، تعداد دانه در کپسول، وزن هزار دانه، عملکرد شاخه اصلی، طول

## جدول ۱- تجزیه واریانس ساده و تجزیه دی آلل به روش II گریفینگ برای صفات زراعی کنجد در شرایط آبیاری نرمال

Table 1. Simple analysis of variance and diallel analysis using Griffing II method for agronomic traits of sesame under normal irrigation condition

S.O.V.	منبع تغیرات	df.	میانگین مربuat									
			درجه آزادی	تعداد روز تا گل دهی	تعداد روز تا پایان گل دهی	طول دوره گلدهی	تعداد روز تا رسیدن	ارتفاع شاخه	کپسول اصلی	ارتفاع در شاخه اصلی	طول شاخه اولین کپسول	قطر شاخه
			Days to flowering	days to end flowering	Flowering duration	Capsule maturity	Plant height	Cap. m. stem	First cap. height	Prod. stem length	Stem dia.	
Replication	تکرار	2	2.90 <sup>ns</sup>	37.75 <sup>ns</sup>	20.58 <sup>ns</sup>	11.58 <sup>ns</sup>	21.53 <sup>ns</sup>	16.58 <sup>ns</sup>	104.60 <sup>ns</sup>	62.99 <sup>ns</sup>	0.75 <sup>ns</sup>	
Treatment	تیمار	27	21.52 <sup>**</sup>	139.27 <sup>**</sup>	88.87 <sup>**</sup>	160.50 <sup>**</sup>	451.90 <sup>**</sup>	962.00 <sup>**</sup>	249.64 <sup>**</sup>	152.61 <sup>**</sup>	2.04 <sup>**</sup>	
GCA	ترکیب پذیری عمومی	6	74.65 <sup>**</sup>	521.05 <sup>**</sup>	307.67 <sup>**</sup>	623 <sup>**</sup>	661.00 <sup>**</sup>	3827.00 <sup>**</sup>	606.18 <sup>**</sup>	57.98 <sup>ns</sup>	5.69 <sup>**</sup>	
SCA	ترکیب پذیری خصوصی	21	6.35 <sup>**</sup>	30.18 <sup>ns</sup>	26.36 <sup>ns</sup>	28.35 <sup>**</sup>	392.10 <sup>**</sup>	143.60 <sup>**</sup>	147.77 <sup>**</sup>	179.65 <sup>**</sup>	1.00 <sup>*</sup>	
Error	خطا	54	2.68	23.00	21.48	12.18	58.94	29.81	40.37	64.83	0.45	
CV%	درصد ضریب تغیرات		2.90	4.90	11.65	2.85	6.39	13.10	12.21	11.83	7.83	

ns, \* and \*\*: Not significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

ns, \* and \*\*: به ترتیب غیرمعنی دار، معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد و ۱ درصد.

۴۷

Table 1. Continued

ادامه جدول ۱

S.O.V.	منبع تغیرات	df.	میانگین مربuat									
			درجه آزادی	تعداد دانه در کپسول	وزن هزار دانه	عملکرد 1000-sw	طول کپسول	طول میانگره	تعداد کره غیرزاينده	تعداد گره زاينده	تعداد کل گره	تعداد Total node
			Seed per cap.	dales per capsule	g/1000 sw	M.S. yield	Cap. length	Internode length	Non prod. node	Prod. node		
Replication	تکرار	2	171.98 <sup>**</sup>	0.48 <sup>**</sup>	1.98 <sup>ns</sup>	0.18 <sup>**</sup>	3.73*	0.30 <sup>ns</sup>	0.49 <sup>s</sup>	0.99 <sup>ns</sup>		
Treatment	تیمار	27	71.17 <sup>**</sup>	0.20 <sup>**</sup>	7.11 <sup>**</sup>	0.08 <sup>**</sup>	1.67*	2.07 <sup>**</sup>	22.76 <sup>**</sup>	32.66 <sup>**</sup>		
GCA	ترکیب پذیری عمومی	6	99.77 <sup>**</sup>	0.60 <sup>**</sup>	21.64 <sup>**</sup>	0.14 <sup>**</sup>	2.13*	4.11 <sup>**</sup>	65.87 <sup>**</sup>	95.77 <sup>**</sup>		
SCA	ترکیب پذیری خصوصی	21	63.00 <sup>**</sup>	0.08 <sup>ns</sup>	2.96 <sup>**</sup>	0.06*	1.54 <sup>ns</sup>	1.49 <sup>**</sup>	10.45 <sup>**</sup>	14.63 <sup>**</sup>		
Error	خطا	54	23.05	0.05	0.70	0.03	0.91	0.22	2.42	2.82		
CV%	درصد ضریب تغیرات		8.34	6.63	16.93	6.38	15.02	7.51	8.93	7.09		

ns, \* and \*\*: Not significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

ns, \* and \*\*: به ترتیب غیرمعنی دار، معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد و ۱ درصد.

## جدول ۲- تجزیه واریانس ساده و تجزیه دی‌آلل به روش II گریفینگ برای صفات زراعی کنجد در شرایط محدودیت آبیاری

Table 1. Simple analysis of variance and diallel analysis using Griffing II method for agronomic traits of sesame under limited-water condition

S.O.V.	منبع تغیرات	درجه آزادی df.	میانگین مربعات										قطر شاخه Stem dia.
			تعداد روز تا گل دهی Days to flowering	تعداد روز تا پایان گل دهی days to end flowering	طول دوره گلدهی Flowering duration	تعداد روز Capsule maturity	ارتفاع شاخه اصلی Plant height	پرسول در شاخه اصلی Cap. m. stem	ارتفاع اولین کپسول First cap. height	طول شاخه اصلی زاینده Prod. Stem length	شاخه Stem dia.		
Replication	تکرار	2	18.72*	5.25 <sup>ns</sup>	42.04**	35.44 <sup>ns</sup>	192.52*	87.60 <sup>ns</sup>	4.78 <sup>ns</sup>	217.29**	1.94*		
Treatment	تیمار	27	21.44**	89.59**	65.06**	213.57**	97.53**	314.60**	182.92**	113.75**	0.43 <sup>ns</sup>		
GCA	ترکیب پذیری عمومی	6	48.38**	229.50**	120.94**	597.86**	169.00**	182.27**	537.36**	210.44**	0.16 <sup>ns</sup>		
SCA	ترکیب پذیری خصوصی	21	13.75**	49.61**	49.09**	103.77**	77.10*	352.42**	81.65**	86.13*	0.51 <sup>ns</sup>		
Error	خطا	54	5.14	7.49	7.25	14.20	38.90	29.73	28.45	25.56	0.53		
CV%	درصد ضریب تغیرات		4.04	2.91	7.13	3.19	6.24	17.88	10.23	10.58	9.06		

ns, \* and \*\*: Not significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

\* و \*\*: به ترتیب غیرمعنی دار، معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد و ۱ درصد.

Table 2. Continued

## ادامه جدول ۲

S.O.V.	منبع تغیرات	درجه آزادی df.	میانگین مربعات										کل گره Total node
			تعداد دانه در کپسول Seed per cap.	وزن 1000-sw	عملکرد M.S. yield	طول کپسول Cap. length	طول میانگره Internode length	تعداد دانه هزار دانه 1000-s	تعداد شاخه اصلی M. S. yield	تعداد کره غیر زاینده Non prod. node	تعداد کره زاینده Prod. node		
Replication	تکرار	2	23.81 <sup>ns</sup>	0.005 <sup>ns</sup>	6.18**	0.007 <sup>ns</sup>	2.58 <sup>ns</sup>	0.28 <sup>ns</sup>	37.36**	35.60**			
Treatment	تیمار	27	46.45**	0.131**	2.30**	0.070**	1.01 <sup>ns</sup>	1.98**	6.49**	10.93**			
GCA	ترکیب پذیری عمومی	6	55.51**	0.227**	1.13 <sup>ns</sup>	0.090**	2.04 <sup>ns</sup>	4.84**	7.87*	14.70**			
SCA	ترکیب پذیری خصوصی	21	43.87**	0.100**	2.64**	0.070**	0.72 <sup>ns</sup>	1.16**	6.1**	9.85**			
Error	خطا	54	15.72	0.0310	0.75	0.012	1.47	0.22	2.69	2.83			
CV%	درصد ضریب تغیرات		7.18	5.400	23.28	3.880	19.30	7.09	11.36	7.94			

\* و \*\*: به ترتیب غیرمعنی دار، معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد و ۱ درصد.

ns, \* and \*\*: Not significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

تعداد روز تا خاتمه گل‌دهی، تعداد روز گل‌دهی، وزن هزار دانه و طول میانگرۀ غیر معنی دار بود. نتایج به دست آمده عموماً با نتایج مانوهاران و همکاران (Manoharan *et al.*, 1989) و دینگ و همکاران (Ding *et al.*, 1993) مطابقت داشت. در شرایط محدودیت آبی نیز ترکیب‌پذیری خصوصی برای بیشتر صفات به غیر از صفات قطر شاخه و طول میانگرۀ، معنی دار بود. معنی دار شدن ترکیب‌پذیری عمومی (GCA) و ترکیب‌پذیری خصوصی (SCA) در اکثر صفات نشان‌دهنده نقش توأم اثر افزایشی و غیر افزایشی را در کنترل ژنتیکی آن‌ها نشان می‌دهد.

**بررسی ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی**  
برآورد و آزمون اثر ترکیب‌پذیری عمومی (GCA) برای صفات زراعی کنجد در شرایط آبیاری و محدودیت آبی به ترتیب در جدول‌های ۳ و ۴ و نیز برآورد اثر ترکیب‌پذیری خصوصی (SCA) در شرایط آبیاری و محدودیت آبی به ترتیب در جدول‌های ۵ و ۶ ارائه و بر مبنای جدول‌های مذکور تحلیل‌های مربوطه انجام شد.

**تعداد روز تا گل‌دهی:** بر مبنای نتایج به دست آمده در هر دو شرایط آبیاری و محدودیت آبیاری، والدهای زودرس فلسطینی و TLHE برای کاهش تعداد روز تا گل‌دهی می‌توانند مورد نظر قرار گیرند. در شرایط آبیاری، دورگ  $\times$  داراب ۱ و در شرایط

نشان داده شده است. در شرایط آبیاری تیمارهای آزمایشی شامل ترکیبات ژنتیکی والدینی و دورگهای یک طرفه در تمام صفات تفاوت‌های معنی دار داشتند. در شرایط محدودیت آبی به جز صفات قطر شاخه و طول میانگرۀ در تمام صفات اختلاف‌ها معنی دار بودند و بر این مبنای برای دو صفت اخیر تجزیه‌های بعدی انجام نشد. ترکیب‌پذیری عمومی صفات در شرایط آبیاری به استثناء صفت طول شاخه اصلی زاینده معنی دار بود. در شرایط محدودیت آبی ترکیب‌پذیری عمومی برای تمام صفات با استثناء صفات قطر شاخه، عملکرد شاخه اصلی و طول میانگرۀ معنی دار بود. در دو شرایط اجرای آزمایش اثر برای صفات یاد شده تفاوت معنی دار داشتند. بر این مبنای جزء ژنتیکی واریانس قابل توارث در وراثت صفات نقش داشت و محاسبات بعدی برای والدهای استفاده شده تجزیه و تحلیل شدند. منصوری و احمدی (Mansouri and Ahmadi, 1997) و کول (Banerjee and Kole, 2009) در مورد تمام صفات با استثناء وزن هزاردانه، نتایج مشابهی اعلام کردند. متفاوت بودن مواد ژنتیکی استفاده شده و تفاوت‌های محیطی به ویژه برای صفاتی که نسبت به محیط اثر متقابل و واکنش نشان می‌دهند، در بروز اختلاف در نتایج این پژوهش با پژوهش‌های مشابه دخیل بوده و قابل انتظار است. در شرایط آبیاری، ترکیب‌پذیری خصوصی برای اغلب صفات به غیر از صفات

### جدول ۳- برآورد و آزمون اثر ترکیب پذیری عمومی (GCA) برای صفات زراعی کنجد در شرایط آبیاری نرمال

Table 3. Estimation of general combining ability (GCA) effects for agronomic traits of sesame under normal Irrigation condition

شماره ژنتیکی Genotype no.	والد Parent	تعداد روز تا پایان گل دهی Days to flowering	تعداد روز تا پایان گل دهی days to end flowering	طول دوره گلدهی Flowering duration	تعداد روز تا رسیدن کپسول Capsule maturity	ارتفاع شاخه اصلی Plant Height	کپسول در شاخه اصلی Cap. m. stem	ارتفاع اولین کپسول First cap. height	قطر شاخه Stem dia.
1	p1	0.69*	-4.88**	-5.57**	2.17**	-2.04	-8.51**	-1.76	-0.39**
2	p2	-0.02	0.83	0.84	4.13**	2.65	-7.87**	1.41	0.22
3	p3	2.43**	6.46**	4.03**	3.35**	4.82**	14.38**	6.29**	0.28*
4	p4	0.28	-0.25	-0.53	3.35	5.61**	-8.33**	3.99**	0.20
5	p5	0.69*	3.97**	3.29**	-0.31	1.49	19.45**	1.71	0.67**
6	p6	-2.87**	-5.80**	-2.94**	-8.94**	-5.82**	-7.74**	-7.11**	-0.55**
7	p7	-1.20**	-0.32	0.88	-3.76**	-6.70**	-1.39	-4.53**	-0.44**
se[g(i)]		0.29	0.85	0.83	0.62	1.37	0.97	1.13	0.12
se[g(i)- g(j)]		0.45	1.31	1.26	0.95	2.09	1.49	1.73	0.18

ns, \* and \*\*: Not significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

ns و \*\*: به ترتیب غیرمعنی دار، معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد و ۱ درصد.

P1: Ultan cv; P2: Darab ۱؛ P3: Varamin ۲۸۲۲؛ P4: Dashtestan ۲؛ P5: Karaj ۱؛ P6: Felestini؛ P7: TLHE.

### ادامه جدول ۳

Table 3. Continued

شماره ژنتیکی Genotype no.	والد Parent	تعداد دانه در کپسول Seed per cap.	وزن هزار دانه 1000-sw	عملکرد شاخه اصلی M.S. yield	طول کپسول Cap. length	طول میانگره Internode length	تعداد کره غیرزاينده Non prod. node	تعداد گره زاينده Prod. node	تعداد کل گره Total node
1	p1	1.02	-0.01	-0.01	0.02	-0.30	-0.34**	-1.71**	-2.05**
2	p2	1.64	0.12**	-0.81**	0.06*	0.01	0.14	-0.49	-0.35
3	p3	1.79*	0.11**	0.91**	0.03	0.13	0.49**	1.97**	2.46**
4	p4	0.51	0.20**	-0.64**	0.01	0.46**	0.21*	-0.60*	-0.39
5	p5	-3.66**	-0.15**	1.54**	-0.15**	0.19	0.34**	2.44**	2.77**
6	p6	-0.03	-0.19**	-0.70**	-0.04	-0.26	-0.53**	-0.84**	-1.37**
se[g(i)]		0.86	0.04	0.15	0.03	0.17	0.09	0.28	0.30
se[g(i)- g(j)]		1.31	0.06	0.23	0.05	0.26	0.13	0.42	0.46

ns, \* and \*\*: Not significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

ns و \*\*: به ترتیب غیرمعنی دار، معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد و ۱ درصد.

P1: Ultan cv; P2: Darab ۱؛ P3: Varamin ۲۸۲۲؛ P4: Dashtestan ۲؛ P5: Karaj ۱؛ P6: Felestini؛ P7: TLHE.

#### جدول ۴- برآورد و آزمون اثر ترکیب پذیری عمومی (GCA) برای صفات زراعی کنجد در شرایط محدودیت آبی

Table 4. Estimation of general combining ability (GCA) effects for agronomic traits of sesame under limited-water condition

شماره ژنوتیپ Genotype no.	والد Parent	تعداد روز تا گل دهی Days to flowering	تعداد روز تا پایان گل دهی days to end flowering	طول دوره گلدهی Flowering duration	تعداد روز تا رسیدن کپسول Capsule maturity	ارتفاع شاخه اصلی Plant height	کپسول در شاخه اصلی Cap. m. stem	ارتفاع اولین کپسول First cap. height	طول شاخه اصلی زاینده Prod. Stem length
1	p1	-0.37	-2.65**	-2.28**	-1.93**	-4.61**	0.04	-4.94**	0.33
2	p2	0.52	-1.80**	-2.32**	1.33*	1.65	-5.21**	0.86	0.79
3	p3	1.41**	4.20**	2.79**	5.41**	2.88**	-0.13	4.74**	-1.86*
4	p4	1.52**	1.83**	0.31	5.81**	0.45	-0.59	3.37**	-2.92**
5	p5	0.22	2.98**	2.76**	0.19	1.62	1.30	4.68**	-3.06**
6	p6	-2.19**	-2.76**	-0.58	-7.11**	-0.51	1.65	-4.88**	4.37**
7	p7	-1.11**	-1.80**	-0.69	-3.70**	-1.48	2.94**	-3.83**	2.35**
se[g(i)]		0.40	0.49	0.48	0.67	1.11	0.97	0.95	0.90
se[g(i)- g(j)]		0.62	0.75	0.73	1.03	1.70	1.48	1.45	1.38

\* و \*\*: به ترتیب غیرمعنی دار، معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد و ۱ درصد.

ns: ns

P1: Ultan cv. P2: Darab 1 P3: Varamin 2822 ۲۸۲۲؛ دشتستان ۲؛ نورامین ۱؛ داراب ۱؛ زودرس فلسطینی؛ کرج ۱؛ Felestini P7: TLHE.

Table 4. Continued

#### ادامه جدول ۴

شماره ژنوتیپ Genotype no.	والد Parent	تعداد دانه در کپسول Seed per cap.	وزن هزار دانه 1000-sw	عملکرد شاخه اصلی M.S. yield	طول کپسول Cap. length	تعداد گره غیرزاینده Non prod. node	تعداد گره زاینده Prod. node	تعداد کل گره Total node
1	p1	-0.29	0.02	-0.16	-0.01	-0.38**	-0.73	-1.12**
2	p2	1.62*	0.05*	-0.16	0.10**	-0.12	-0.76**	-0.88**
3	p3	1.59*	0.08**	-0.10	0.02	0.33**	0.35	0.68*
4	p4	0.65	0.08**	-0.15	-0.05*	0.39**	0.19	0.57
5	p5	-2.38**	0.04	0.00	-0.08**	0.58**	0.06	0.64*
6	p6	-0.21	-0.13**	0.26	-0.01	-0.44**	0.64*	0.19
7	p7	-0.99	-0.13**	0.31*	0.03	-0.35**	0.26	-0.09
se[g(i)]		0.71	0.03	0.15	0.02	0.09	0.29	0.30
se[g(i)- g(j)]		1.08	0.05	0.24	0.03	0.13	0.45	0.46

ns, \* and \*\*: Not significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

ns

P1: Ultan cv. P2: Darab 1 P3: Varamin 2822 ۲۸۲۲؛ دشتستان ۲؛ نورامین ۱؛ داراب ۱؛ زودرس فلسطینی؛ کرج ۱؛ Felestini P7: TLHE.

صفت طول دوره گل دهی غیر معنی دار بود. در شرایط محدودیت آبی، بالاترین ترکیب پذیری خصوصی درجهت افزایش این صفت در دورگ ورامین ۲۸۲۲ × اولتان و بیشترین ترکیب پذیری خصوصی درجهت کاهش این صفت در دورگ زودرس فلسطینی × ورامین ۲۸۲۲ برآورد شد.

**تعداد روز تا رسیدن کپسول:** در هر دو شرایط به ترتیب استفاده از والدهای زودرس فلسطینی و TLHE با ترکیب پذیری عمومی منفی و معنی دار، کاهش تعداد روز تا رسیدن کپسول و به عبارت دیگر زودرسی را داشتند. در شرایط آبیاری والدهای داراب ۱، ورامین ۲۸۲۲، دشتستان ۲ و اولتان و در شرایط محدودیت آبی والدهای دشتستان ۲ و ورامین ۲۸۲۲ با ترکیب پذیری عمومی معنی دار مثبت می‌تواند برای افزایش اندازه این صفت کاربرد داشته باشد. در شرایط آبیاری و محدودیت آبی برای افزایش صفت بیشترین ترکیب پذیری خصوصی، به ترتیب در دورگ‌های خصوصی، TLHE × ورامین ۲۸۲۲ و TLHE × کرج ۱ برآورد شد. ترکیب پذیری خصوصی همه ترکیبات برای کاهش اندازه این صفت در شرایط آبیاری غیر معنی دار بود. در شرایط محدودیت آبی، ترکیب پذیری خصوصی منفی و معنی دار در دورگ زودرس فلسطینی × اولتان در بالاترین مقدار بود.

**ارتفاع شاخه اصلی:** در شرایط آبیاری ارقام دشتستان ۲ و ورامین ۲۸۲۲ و در شرایط

محدودیت آبی دورگ TLHE × ورامین ۲۸۲۲ دارای بیشترین ترکیب پذیری خصوصی در جهت افزایش اندازه صفت بودند. برای کاهش اندازه این صفت در شرایط آبیاری دورگ دشتستان ۲ × ورامین ۲۸۲۲ و در شرایط محدودیت آبی دورگ زودرس فلسطینی × اولتان شناخته شدند.

**تعداد روز تا خاتمه گل دهی:** در هر دو شرایط والدهای زودرس فلسطینی و اولتان به ترتیب بالاترین اندازه‌های ترکیب پذیری عمومی منفی و معنی دار و والدهای ورامین ۲۸۲۲ و کرج ۱ ترکیب پذیری عمومی مثبت و معنی دار داشتند. در شرایط آبیاری ترکیب پذیری خصوصی صفت تعداد روز تا خاتمه گل غیر معنی دار بود. در شرایط محدودیت آبی، دورگ ورامین ۲۸۲۲ × اولتان بالاترین ترکیب پذیری خصوصی مثبت را در جهت افزایش اندازه این صفت نشان دادند، همچنین بالاترین ترکیب پذیری خصوصی منفی مربوط به دورگ دشتستان ۲ × ورامین ۲۸۲۲ بود.

**طول دوره گل دهی:** در شرایط آبیاری والدهای اولتان و زودرس فلسطینی و در شرایط محدودیت آبی والدهای داراب ۱ و اولتان با ترکیب پذیری عمومی معنی دار و منفی در جهت کاهش زمان گل دهی و متقابلاً در راستای افزایش زمان گل دهی در هر دو شرایط والدهای ورامین ۲۸۲۲ و کرج ۱ مورد توجه خواهند بود. در شرایط آبیاری ترکیب پذیری خصوصی برای

### جدول ۵- برآورد اثر ترکیب پذیری خصوصی (SCA) برای صفات زراعی کنجد در شرایط آبیاری نرمال

Table 5. Estimation of specific combining ability (SCA) effects for agronomic traits of sesame under normal irrigation condition

ردیف	شماره	دورگه	تعداد روز تا گل دهی	تعداد روز تا رسیدن کپسول	ارتفاع شاخه اصلی	کپسول در شاخه اصلی	ارتفاع اوین کپسول	طول شاخه اصلی زاینده	قطر شاخه در کپسول	تعداد دانه شاخه اصلی در کپسول	عملکرد شاخه اصلی M.S. yield	طول کپسول Cap. length	تعداد گره غیرزاينده Non prod. node	تعداد گره گره زاینده Prod. node	تعداد گره کل Total node
No.	Hybrid	Days to flowering	Capsule maturity	Plant height	Cap. m. stem	First cap. height	Prod. Stem length	Seed Dia.	per cap.						
1	1 × 2	0.35	-1.11	1.02	3.15	2.89	3.57	0.57	6.79**	0.57	0.18	0.47	0.55	1.02	
2	1 × 3	1.91*	0.67	1.90*	-5.60*	8.22*	2.89	0.12	2.01	-1.01*	0.21*	0.45	1.45	1.90*	
3	1 × 4	0.72	-0.33	0.05	2.27	4.28	3.93	0.39	-0.23	-0.03	0.16	0.50*	-0.45	0.05	
4	1 × 5	2.31**	0.00	-0.98	-13.53**	8.57**	-5.36	-0.79*	2.73	-1.29**	0.19	0.50*	-1.48	-0.98	
5	1 × 6	-1.46	1.30	1.88*	5.64*	0.32	9.28*	0.56	4.13	2.09**	0.10	0.14	1.73*	1.88*	
6	1 × 7	-0.46	-2.22	1.64	1.54	-1.02	6.18	0.31	1.57	0.94*	-0.01	0.13	1.51	1.64	
7	2 × 3	0.61	-1.30	0.98	-8.20**	0.10	4.55	-0.57	-1.03	-0.47	-0.05	-0.04	1.03	0.98	
8	2 × 4	-0.57	0.70	-0.47	2.90	0.40	-2.49	0.18	-3.24	0.27	-0.12	0.00	-0.47	-0.47	
9	2 × 5	-0.31	4.37*	2.27**	-5.21	0.85	10.55*	0.35	-2.60	-1.17**	0.05	0.99**	1.29	2.27**	
10	2 × 6	-1.09	2.33	0.93	3.86	5.08	-2.16	0.50	4.28	0.28	0.03	0.40	0.53	0.93	
11	2 × 7	2.24**	3.15	2.21*	5.91*	2.45	6.85	0.48	0.89	0.46	0.07	-0.28	2.49**	2.21*	
12	3 × 4	-2.35**	0.15	1.16	-4.64	-6.82*	4.88	-0.32	1.04	-0.20	0.06	-0.41	1.57	1.16	
13	3 × 5	-1.76*	2.48	1.58	3.63	3.79	-1.06	0.14	5.02*	-0.37	0.00	0.85**	0.73	1.58	
14	3 × 6	-0.20	-2.89	1.35	-6.36*	2.15	8.29*	0.43	4.56	-0.19	0.14	0.06	1.28	1.35	
15	3 × 7	-1.20	5.93*	-1.21	-2.65	12.37**	-14.76**	0.06	4.21	0.58	-0.04	1.30	-2.52**	-1.21	
16	4 × 5	-0.61	-0.52	0.45	-7.54**	4.97	-0.87	-0.25	4.57	-0.45	0.04	0.42	0.04	0.45	
17	4 × 6	0.28	2.44	-1.55	1.25	0.12	-1.84	0.02	0.97	0.05	-0.06	-0.28	-1.26	-1.55	
18	4 × 7	1.61	4.59*	2.56**	2.96	7.43*	1.50	0.45	0.23	0.43	-0.02	0.39	2.17**	2.56**	
19	5 × 6	0.54	-3.22	1.92*	-4.37	4.45	6.49	0.36	-0.16	-0.01	0.05	-0.01	1.93	1.92*	
20	5 × 7	2.10	-0.74	-0.36	7.41**	-7.05*	4.18	0.30	-0.68	1.52**	-0.04	-0.71**	0.35	-0.36	
21	6 × 7	0.43	-0.11	1.70*	4.05	1.45	5.84	0.51	1.52	0.09	0.11	0.36	1.34	1.70*	

ns, \* and \*\*: Not significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

و \*\*: به ترتیب غیرمعنی دار، معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد و ۱ درصد.

P1: Ultan cv; P2: Darab ۱؛ P3: Varamin 2822؛ P4: Dashtestan ۲؛ P5: Karaj ۱؛ P6: Felestini؛ P7: TLHE؛ زودرس فلسطینی؛ کرج؛ دشتستان ۲؛ ورامین ۲۸۲۲؛ داراب ۱؛ رقم اولان.

## جدول ۶- برآورد اثر ترکیب پذیری خصوصی (SCA) برای صفات زراعی کنجد در شرایط محدودیت آبی

Table 6. Estimation of specific combining ability (SCA) effects for agronomic traits of sesame under limited-water condition

شماره	دورگ	تعداد روز تا گل دهی	تعداد روز تا پایان گلدهی	طول دوره گلدهی	تعداد روز تاریخی	ارتفاع شاخه	کبسول در شاخه اصلی	ارتفاع اولین کبسول اصلی	طول شاخه اصلی	تعداد دانه در کبسول	وزن هزار دانه	عملکرد شاخه اصلی	طول کبسول	تعداد کره غیرزاپنه زاپنه	تعداد گره	تعداد کل گره
No.	Hybrid	Days to flowering	Days to End flowering	Flowering duration	Capsule maturity	Plant height m. stem	Cap. m. stem	First cap. height	Prod. stem length	Seed per cap.	1000 -sw	M.S. yield	Cap. length	Non prod. node	Prod. node	Total node
1	1 × 2	2.44*	0.59	-1.84	8.01**	-5.99	-8.35**	3.11	-9.09**	-4.75*	0.03	-1.14*	-0.17**	0.49*	-1.74*	-1.25
2	1 × 3	0.88	7.59**	6.71**	4.94*	4.35	23.51**	8.94**	4.58	1.13	-0.07	1.38**	-0.12*	1.21	2.25**	3.46**
3	1 × 4	0.44	-3.37**	-3.81**	3.53	1.97	-10.11**	4.63	-2.66	-2.43	0.13	-0.77	0.06	-0.15	-0.94	-1.09
4	1 × 5	-0.94	0.15	1.08	-3.51	-4.55	18.82**	-3.68	-0.88	-6.87**	-0.42**	1.42**	-0.38	-0.31	0.04	-0.27
5	1 × 6	-4.53**	-1.11	3.42*	-12.21**	-0.42	-9.35**	-1.53	1.11	1.25	-0.10	-1.10*	0.00	-0.45	-0.26	-0.71
6	1 × 7	-2.94*	-1.41	1.53	-9.95*	-7.10*	2.13	1.79	-8.89**	-2.72	-0.20*	-0.43	-0.09	0.12	-0.93	-0.82
7	2 × 3	0.99	4.41**	3.42*	1.34	3.76	5.83*	4.71	-0.96	1.41	-0.03	0.60	0.06	0.24	1.09	1.32
8	2 × 4	-1.12	-1.56	-0.44	-1.73	6.67*	-3.26	0.72	5.94*	1.61	-0.04	-0.32	0.01	-0.41	-0.11	-0.52
9	2 × 5	1.51	0.96	-0.55	-8.10**	0.17	3.94	-2.56	2.73	1.43	-0.04	0.62	0.19**	-0.55*	0.28	-0.28
10	2 × 6	-2.42*	-1.96	0.45	-5.47**	0.08	2.14	-4.99	5.06	-0.14	-0.07	0.24	-0.09	-0.18	1.29	1.11
11	2 × 7	0.18	0.07	-0.10	1.79	5.41	0.97	-0.34	5.75*	2.90	0.23**	0.59	0.15**	-0.23	0.90	0.66
12	3 × 4	-0.01	-5.89**	-5.88	-1.81	-3.24	-9.90**	-5.49*	2.24	-0.04	0.12	-0.73	0.03	-0.83	-2.07*	-2.91**
13	3 × 5	-2.05	-0.04	2.01	-0.84	-1.38	-1.89	-1.36	-0.02	-1.77	-0.11	-0.35	0.02	0.34	-0.51	-0.17
14	3 × 6	0.36	-5.30**	-5.66**	-0.21	-3.16	-9.33**	-2.70	-0.46	4.04*	-0.01	-0.47	0.08	-0.60*	-1.68*	-2.28**
15	3 × 7	3.62**	0.41	-3.21*	1.38	2.61	-5.89*	1.99	0.62	-1.00	0.17*	-0.61	0.11*	-0.13*	-0.82	-0.96
16	4 × 5	0.84	3.33*	2.49	0.75	-1.00	8.11**	6.06*	-7.06**	2.09	-0.10	-0.02	-0.11*	0.94**	0.25	1.20
17	4 × 6	0.92	6.74**	5.82**	2.71	7.69*	5.06	3.68	4.01	1.99	-0.04	0.74	0.02	0.55*	2.04*	2.58**
18	4 × 7	-0.16	5.78**	5.94**	2.97	1.59	14.50**	3.86	-2.27	4.17*	-0.07	1.67**	0.07	0.64*	1.30*	1.94*
19	5 × 6	-0.45	-5.74**	-5.29**	0.01	-2.66	-13.14*	-1.16	-1.50	3.23	0.23**	-1.14*	0.07	-0.52*	-3.09**	-3.60**
20	5 × 7	2.14	-3.70**	-5.84	10.94**	8.89**	-7.27**	7.34**	1.56	3.49	0.25**	-0.80	0.13*	0.53*	0.46	1.00
21	6 × 7	2.21	4.70*	2.49	3.90*	0.27	16.19**	4.87	-4.60	-8.03**	0.17*	1.51**	-0.16**	0.90**	0.80	1.70*
se[s(i,j)]		1.18	1.42	1.40	1.95	3.23	2.83	2.76	2.62	2.06	0.09	0.45	0.06	0.25	0.85	0.87
se[s(i,j)-s(i,k)]		1.75	2.11	2.07	2.90	4.80	4.20	4.11	3.89	3.05	0.13	0.67	0.08	0.37	1.26	1.30
se[s(i,j)-s(k,l)]		1.63	1.97	1.94	2.71	4.49	3.93	3.84	3.64	2.86	0.13	0.62	0.08	0.34	1.18	1.21

ns, \* and \*\*: Not significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

\* و \*\* به ترتیب غیرمعنی دار، معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد و ۱ درصد.

P1: Ultan cv. P2: Darab ۱ ۱؛ P3: Varamin ۲۸۲۲؛ P4: Dashtestan ۲؛ P5: Karaj ۱؛ P6: Felestini؛ P7: TLHE؛ زودرس فلسطینی؛ رقم اولان

**طول شاخه اصلی ذاینده: ترکیب پذیری عمومی** در شرایط آبیاری غیرمعنی دار بود. در شرایط محدودیت آبی والدهای زودرس فلسطینی و TLHE در جهت مثبت و افزایش اندازه صفت دارای ترکیب پذیری عمومی معنی دار بودند و استفاده از والدهای کرج ۱، دشتستان ۲ و ورامین ۲۸۲۲ در کاهش اندازه نقش خواهند داشت. بیشترین ترکیب پذیری خصوصی مثبت و معنی دار در شرایط آبیاری و محدودیت آبی به ترتیب در دورگهای کرج ۱ × داراب ۱ و دشتستان ۲ × داراب ۱ بود.

**قطر شاخه: در شرایط آبیاری، والدهای زودرس فلسطینی، TLHE و اولتان در جهت کاهش دارای ترکیب پذیری عمومی معنی دار بودند و استفاده از والدهای کرج ۱ و ورامین ۲۸۲۲ افزایش اندازه این صفت را همراه خواهد داشت. ترکیب پذیری عمومی این صفت در شرایط محدودیت آبی غیرمعنی دار بود. در شرایط آبیاری، ترکیب پذیری دورگهای برای افزایش قطر شاخه غیرمعنی دار و نیز ترکیب پذیری خصوصی در شرایط محدودیت آبی معنی دار نبود.**

**صفت تعداد دانه در کپسول: در شرایط آبیاری، والد ورامین ۲۸۲۲ و در شرایط محدودیت آبی والدهای ورامین ۲۸۲۲ و داراب ۱ در افزایش صفت معنی دار بودند. دورگهای داراب ۱ × اولتان در شرایط آبیاری و دورگهای TLHE × دشتستان ۲ در شرایط محدودیت آبی برای این صفت، ترکیب پذیری**

محدودیت آبی صرفاً رقم ورامین ۲۸۲۲ با ترکیب پذیری عمومی معنی دار مثبت می‌تواند در افزایش این صفت ایفای نقش کند. در شرایط آبیاری برای صفت طول شاخه اصلی، تعداد هفت ترکیب دورگ، ترکیب پذیری خصوصی معنی دار و مثبت داشتند. در شرایط محدودیت آبی دورگ TLHE × کرج ۱ بالاترین ترکیب پذیری خصوصی مثبت را داشت.

**تعداد کپسول در شاخه اصلی: در شرایط آبیاری ارقام والدی کرج ۱ و ورامین ۲۸۲۲ و در شرایط محدودیت آبی رقم والدی TLHE در راستای افزایش تعداد کپسول تاثیرگذار بودند. در دو شرایط آبیاری و محدودیت آبی، به ترتیب دورگهای TLHE × کرج ۱ و ورامین ۲۸۲۲ × اولتان بهترین ترکیبات معنی دار بودند.**

**ارتفاع اولین کپسول: در شرایط آبیاری والدهای زودرس فلسطینی و TLHE و در شرایط محدودیت آبی ارقام اولتان، زودرس فلسطینی و TLHE به ترتیب در جهت کاهش اندازه این صفت و متقابلاً در جهت افزایش صفت در شرایط آبیاری والدهای ورامین ۲۸۲۲ و دشتستان ۲ و در شرایط محدودیت آبی والدهای ورامین ۲۸۲۲ و کرج ۱ تعیین شدند. بر این مبنای در شرایط آبیاری دورگهای TLHE × کرج ۱ و دشتستان ۲ × ورامین ۲۸۲۲ و در شرایط محدودیت آبی دورگ دشتستان ۲ × ورامین ۲۸۲۲ در جهت کاهش اندازه این صفت مطلوب بودند.**

دشتستان ۲ برای افزایش صفت ترکیب‌پذیری عمومی اثر معنی دار داشت. ترکیب‌پذیری عمومی در شرایط محدودیت آبی و نیز در هر دو شرایط ترکیب‌پذیری خصوصی غیر معنی دار بود.

**تعداد گره غیر زاینده:** در هر دو شرایط، والدهای ورامین ۲۸۲۲، کرج ۱ و دشتستان ۲ به ترتیب به عنوان ترکیب شونده‌های عمومی درجهت افزایش اندازه این صفت و نیز در هر دو شرایط والدهای زودرس فلسطینی، اولتان و TLHE در جهت کاهش اندازه آن شناخته شدند. در شرایط آبیاری، دورگ X TLHE × کرج ۱ با ترکیب‌پذیری خصوصی منفی و معنی دار مطلوب بود. همچنین در شرایط محدودیت آبی، دورگ زودرس فلسطینی × ورامین ۲۸۲۲ دارای ترکیب‌پذیری خصوصی منفی و معنی دار بود.

**تعداد گوه زاینده:** در شرایط آبیاری والد کرج ۱ و در شرایط محدودیت آبی والد زودرس فلسطینی، بیشترین ترکیب‌پذیری عمومی معنی دار را در جهت افزایش این صفت داشت. والد اولتان در شرایط آبیاری والدهای داراب ۱ و اولتان در شرایط قطع آبیاری بیشترین ترکیب‌پذیری عمومی معنی دار را درجهت کاهش تعداد گره زاینده در شاخه اصلی داشتند. دورگ X TLHE × داراب ۱ در شرایط آبیاری و دورگ ورامین ۲۸۲۲ × اولتان در شرایط محدودیت آبی بیشترین ترکیب‌پذیری خصوصی مثبت معنی دار را داشتند.

خصوصی مثبت و معنی دار داشتند.

**وزن هزار دانه:** در هر دو شرایط باستثناء رقم اولتان، همه والدها ترکیب‌پذیری عمومی معنی دار داشتند. در هر دو شرایط، استفاده از ارقام دشتستان ۲، داراب ۱ و ورامین ۲۸۲۲ در جهت افزایش صفت وزن هزار دانه نقش داشتند. همچنین ترکیب‌پذیری خصوصی برای این صفت در شرایط آبیاری غیرمعنی دار بود. در شرایط محدودیت آبی، بیشترین مقدار ترکیب‌پذیری خصوصی در دورگ TLHE × کرج ۱ برآورد شد.

**عملکرد شاخه اصلی:** در شرایط آبیاری، والدهای کرج ۱ و ورامین ۲۸۲۲ به ترتیب در جهت افزایش عملکرد مؤثر بودند. در شرایط محدودیت آبی، ترکیب‌پذیری عمومی این صفت غیرمعنی دار بود. در شرایط آبیاری، بالاترین ترکیب‌پذیری خصوصی مثبت به ترتیب مربوط به دورگ زودرس فلسطینی × اولتان بود. همچنین بالاترین ترکیب‌پذیری خصوصی مثبت در شرایط محدودیت آبی مربوط به دورگ TLHE × دشتستان ۲ مشاهده شد.

**صفت طول کپسول:** در هر دو شرایط آبیاری، رقم داراب ۱ در راستای افزایش صفت ترکیب‌پذیری اثر عمومی معنی دار داشتند. در شرایط آبیاری دورگ ورامین ۲۸۲۲ × اولتان و در شرایط محدودیت آبی کرج ۱ × داراب ۱ بیشترین ترکیب‌پذیری خصوصی مثبت و معنی دار را بودند.

**طول میانگره:** در شرایط آبیاری فقط والد

۶۸ و ۶۰ درصد برآورد شد، ولی در بررسی های Mishra و Yadav (1997) برای صفت تعداد روز تا ۵۰ درصد گلدهی، وراثت پذیری متوسط گزارش شد. درجه متوسط غالیت ژن ها (فاکتور a) در شرایط آبیاری و محدودیت آبی به ترتیب بیانگر وجود رابطه غالیت ناقص و فوق غالیت بین آللهای ژن های دخیل در کنترل این صفت به صورت میانگین بود. در شرایط محدودیت آبی نسبت واریانس ترکیب پذیری عمومی به خصوصی (فاکتور F) کمتر از یک و نشان دهنده نقش بیشتر عمل غیر افزایشی ژن ها بود. همچنین وراثت پذیری عمومی و خصوصی به ترتیب ۸۳ و ۳۳ درصد برآورد شد. نظر به نوع عمل ژن ها و وراثت پذیری خصوصی در شرایط آبیاری، گزینش در راستای بهبود این صفت کارایی خواهد داشت، اما در شرایط محدودیت آبی احتمالاً اثر گزینش نا محسوس و کند خواهد بود.

تعداد روز تا خاتمه گل: در شرایط آبیاری در واریانس فوتیبی سهم واریانس افزایشی (۴۸/۴۸ درصد) بسیار بیشتر از سهم واریانس غیر افزایشی (۴/۲۵) بود، اما در شرایط محدودیت آبی سهم واریانس غالیت (۴۹/۷۰ درصد) بیشتر از سهم واریانس افزایشی (۳۵/۳۸ درصد) برآورد شد. در شرایط آبیاری، وراثت پذیری خصوصی این صفت فوق العاده و در گروه وراثت پذیری بالا قرار گرفت، ولی در شرایط محدودیت آبی وراثت پذیری خصوصی

تعداد کل گره: والدهای کرج ۱ و ورامین ۲۸۲۲ بیشترین ترکیب پذیری عمومی معنی دار را هر دو شرایط، در جهت افزایش تعداد گره داشتند. والدهای اولتان، زودرس فلسطینی و TLHE در شرایط آبیاری و والدهای اولتان و داراب ۱ در شرایط قطع آبیاری در جهت کاهش اندازه این صفت نقش معنی دار داشتند. بیشترین ترکیب پذیری خصوصی مثبت و معنی دار در دو شرایط اجرای آزمایش، به ترتیب در دورگهای TLHE × دشتستان ۲ و ورامین ۲۸۲۲ × اولتان مشاهده شد.

### پارامترهای ژنتیکی

پارامترهای ژنتیکی در دو شرایط اجرای آزمایش در جدول های ۷ و ۸ ارائه شده است که در مواد ژنتیکی موجود با استفاده از آنها رفتارهای احتمالی گیاه را می توان تحلیل کرد:

**تعداد روز تا گلدهی:** در شرایط آبیاری واریانس ترکیب پذیری عمومی در مقایسه با واریانس ترکیب پذیری خصوصی بیشتر و واریانس افزایشی سهم قابل توجهی از واریانس فوتیبی را به خود اختصاص داد. واریانس ترکیب پذیری خصوصی کمتر و نیز واریانس غالیت سهم کمتری را به عهده داشت. نسبت واریانس ترکیب پذیری عمومی به خصوصی نشان دهنده عمل افزایشی ژن ها بود. این نتایج مخالف نتایج گزارش شده توسط Sakila et al., (2000) بود. وراثت پذیری عمومی و خصوصی به ترتیب

## جدول ۷- برآورد اجزاء واریانس فنوتیپی و ژنوتیپی، وراثت پذیری و غالیت برای صفات زراعی کنجد در شرایط آبیاری نرمال

Table 7. Estimates of phenotypic and genotypic components, heritability and dominance for agronomic traits of sesame under normal irrigation condition

Parameter	پارامتر	واریانس ترکیب‌پذیری عمومی	تعداد روز تا گل دهی	تعداد روز تا پایان گل دهی	طول دوره گل دهی	روز تا رسیدن کپسول	ارتفاع شاخه اصلی در شاخه اصلی	کپسول اولين کپسول	ارتفاع اولين زاينده	طول شاخه اصلی زاينده	قطر شاخه
		واریانس ترکیب پذیری خصوصی	Days to flowering	Days to end flowering	Flowering duration	Capsule maturity	Plant height	Cap. m. stem	First cap. height	Prod. stem length	Stem Dia.
Var GCA		واریانس ترکیب‌پذیری عمومی	2.53	18.18	10.42	22.03	9.96	136.4	13.07	0.002	0.17
Var SCA		واریانس ترکیب پذیری خصوصی	1.22	2.39	1.63	5.39	111.06	37.92	15.42	38.27	0.18
Var E		واریانس خطای افراشی	2.68	23.01	21.48	12.19	58.94	29.81	7.77	64.83	0.45
Var (A)		واریانس افزایشی درصد از کل	6.75	48.48	27.78	58.73	26.56	363.8	34.86	.002	0.46
Var (D)		واریانس غالیت درصد از کل	58.14	64.01	53.27	72.96	9.39	78.91	49.77	0.01	37.19
Var (E)		واریانس محیطی درصد از کل	2.17	4.25	2.89	9.58	197.45	67.41	27.41	68.04	0.33
Var (E)		واریانس فنوتیپی درصد از کل	18.74	5.62	5.54	11.90	69.78	14.62	39.14	51.20	26.38
Var phen		واریانس فنوتیپی کل	2.68	23.01	21.48	12.19	58.94	29.81	7.77	64.83	0.45
		واریانس فنوتیپی کل	23.12	30.38	41.19	15.14	20.83	6.47	11.09	48.79	36.43
var phen		واریانس فنوتیپی کل	11.60	75.74	52.16	80.50	282.95	461.00	70.04	132.87	1.24
HeritHb		وراثت پذیری عمومی	90.89	87.30	81.07	94.39	91.94	97.75	96.01	75.89	83.96
HeritHn		وراثت پذیری خصوصی	68.74	80.26	73.43	81.15	10.90	82.46	53.74	0.02	49.12
Avg codamin		میانگین درجه غالیت	0.80	0.42	0.46	0.57	3.86	0.61	1.25	.002	1.19
(F factor)		واریانس ترکیب پذیری عمومی به خصوصی	2.07	7.60	6.41	4.09	0.09	3.60	0.85	0.001	0.94

### ادامه جدول ۷

Table 7. Continued

Parameter	پارامتر	تعداد دانه در کپسول Seed per cap.	تعداد دانه در گیپسول 1000-sw	وزن هزاردانه M.S. yield	عملکرد شاخه اصلی Cap. length	طول کپسول Inter Node length	طول میانگره Non prod. node	تعداد گره غیر زاینده Prod. node	تعداد کل گره Total node
Var GCA	واریانس ترکیبیدنی عوموی	1.36	0.02	0.69	0.24	0.02	0.10	2.05	3.01
Var SCA	واریانس ترکیب پذیری خصوصی	13.32	0.01	0.75	0.01	0.21	0.42	2.68	3.94
Var E	واریانس خطأ	23.06	0.05	0.71	0.03	0.92	0.23	2.42	2.83
Var (A)	واریانس افزایشی درصد از کل	3.63 7.21	0.05 41.63	1.84 47.40	0.01 11.92	0.06 4.37	0.26 20.90	5.47 43.26	8.01 44.92
Var (D)	واریانس غالیت درصد از کل	23.67 47.01	0.02 17.25	1.34 34.42	0.02 33.09	0.37 27.50	0.75 60.65	4.76 37.58	7.00 39.23
Var (E)	واریانس محیطی درصد از کل	23.06 45.78	0.05 41.11	0.71 18.18	0.03 54.99	0.92 68.14	0.23 18.45	2.42 19.16	2.83 15.84
var phen	واریانس فتوتیپی کل	50.36 100.00	0.12 100.00	3.89 100.00	0.06 100.00	1.35 100.00	1.24 100.00	12.65 100.00	17.84 100.00
HeritHb	وراثت پذیری عوموی	78.04	81.12	93.10	71.06	58.38	92.99	92.68	94.10
HeritHn	وراثت پذیری خصوصی	10.38	57.35	53.94	18.81	8.00	23.84	49.59	50.23
Avg codamin	میانگین درجه غالیت	3.61	0.91	1.21	2.36	3.55	2.41	1.32	1.32
(F factor)	واریانس ترکیب پذیری عوموی به خصوصی	0.10	1.61	0.92	0.24	0.11	0.23	0.77	0.76

**جدول ۸- برآورده اجزاء واریانس فنتیپی و ژنتیپی، وراثت پذیری و غالیت برای صفات زراعی کنجد در شرایط محدودیت آبی**  
**Table 8. Estimates of phenotypic and genotypic components, heritability and dominance for agronomic traits of sesame under limited-water condition**

Parameter	پارامتر	تعداد روز تا گل دهی Days to flowering	تعداد روز تا پایان گل دهی Days to end flowering	طول دوره گل دهی Flowering duration	روز تا رسیدن کپسول Capsule maturity	ارتفاع شاخه اصلی Plant height	کپسول در شاخه اصلی Cap. m. stem	ارتفاع اولین کپسول First cap. height	طول شاخه اصلی زاینده Prod. Stem length
Var GCA	واریانس ترکیبی عمومی	1.28	6.66	2.66	18.30	3.40	0.001	16.88	4.60
Var SCA	واریانس ترکیب پذیری خصوصی	2.86	14.04	13.95	29.86	12.73	107.56	17.73	20.19
Var E	واریانس خطأ	5.14	7.50	7.26	14.21	38.91	29.73	28.45	25.56
Var (A)	واریانس افزایشی درصد از کل	3.42 25.02	17.77 35.38	7.10 18.13	48.80 42.04	9.08 12.85	0.001 0.01	45.01 42.87	12.28 16.65
Var (D)	واریانس غالیت درصد از کل	5.09 37.31	24.96 49.70	24.79 63.33	53.08 45.72	22.64 32.06	191.22 86.54	31.53 30.03	35.89 48.68
Var (E)	واریانس محیطی درصد از کل	5.14 37.655	7.50 14.93	7.26 18.54	14.21 12.24	38.91 55.09	29.73 13.45	28.45 27.10	25.56 34.67
var phen	واریانس فنتیپی کل	13.66 100.00	50.22 100.00	39.15 100.00	116.08 100.00	70.62 100.00	220.95 100.00	104.99 100.00	73.73 100.00
HeritHb	وراثت پذیری عمومی	83.24	94.47	92.95	95.56	70.98	95.07	88.98	84.97
HeritHn	وراثت پذیری خصوصی	33.41	39.29	20.68	45.77	20.31	0.001	52.32	21.66
Avg codamin	میانگین درجه غالیت	1.72	1.68	2.64	1.47	2.23	0.01	1.18	2.42
(F factor)	واریانس ترکیب پذیری عمومی به خصوصی	0.44	0.47	0.19	0.61	0.27	0.001	0.95	0.23

## ادامه جدول ۸

Table 8. Continued

Parameter	پارامتر	تعداد دانه در کپسول per cap.	وزن هزار دانه 1000 -sw	عملکرد شاخه اصلی M.S. yield	طول کپسول Cap. length	تعداد کره غیر زاینده Non prod. node	تعداد گره زاینده Prod. node	تعداد گره کل Total node
Var GCA	واریانس ترکیبی عمومی	0.43	0.0003	0.001	0.002	0.14	0.07	0.18
Var SCA	واریانس ترکیب پذیری خصوصی	9.38	0.02	0.62	0.03	0.31	1.14	2.34
Var E	واریانس خطای افزایشی	15.73	0.03	0.75	0.01	0.23	2.70	2.83
Var (A)	درصد از کل	1.15	0.01	0.001	0.00	0.36	0.17	0.48
Var (D)	واریانس غالیت	3.43	14.06	0.01	3.62	31.64	3.56	6.44
	درصد از کل	16.68	0.04	1.11	0.04	0.56	2.02	4.16
Var (E)	واریانس محیطی	49.70	50.48	59.81	72.08	48.44	41.28	55.67
	واریانس میانگین	15.73	0.03	0.75	0.01	0.23	2.70	2.83
	درصد از کل	46.87	35.45	40.18	24.30	19.92	55.16	37.89
var phen	واریانس فوتیجی	33.56	0.09	1.87	0.05	1.15	4.89	7.47
	کل	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
HeritHb	وراثت پذیری عمومی	77.27	84.52	81.70	90.33	92.34	70.92	83.10
HeritHn	وراثت پذیری خصوصی	4.98	18.42	0.01	4.32	36.49	5.63	8.62
Avg codamin	میانگین درجه غالیت	5.39	2.68	0.001	6.31	1.75	4.82	4.16
(F factor)	واریانس ترکیب پذیری عمومی به خصوصی	0.05	0.19	0.002	0.03	0.44	0.06	0.08

(Fatteh *et al.*, 1995) و کمالا (Kamala, 1999) مطابقت داشت ولی با گزارش‌های پادماواتی (Padmavathi, 1999) و کاویتا و همکاران (Kavitha *et al.*, 1999) تفاوت داشت. وراثت‌پذیری عمومی و خصوصی این صفت در شرایط آبیاری در گروه صفات با وراثت‌پذیری بالا طبقه‌بندی شد ولی در بررسی میشرا و یاداو (1997) وراثت‌پذیری متوسط برای صفت تعداد روز تا بلوغ گزارش شد. در شرایط محدودیت آبی، وراثت‌پذیری عمومی در حدود بسیار بالا و وراثت‌پذیری خصوصی در گروه صفات با وراثت‌پذیری متوسط بود که بیانگر احتمال موفقیت آمیز بودن فرایند بهنژادی گزینش برای صفت مذکور بود. در شرایط محدودیت آبی واریانس افزایشی و غالیت سهم تقریباً یکسانی از واریانس فتوتیپی را توضیح دادند، اما نقش عمل غیر افزایشی ژن‌ها بیشتر بود. در شرایط آبیاری، به طور متوسط بین آلل‌های ژن‌های دخالت کننده در کنترل این صفت، رابطه غالیت ناقص و در شرایط محدودیت آبیاری رابطه فوق غالیت وجود داشت.

ارتفاع شاخه اصلی: در شرایط آبیاری، در هدایت این صفت نقش اثر غیرافزایشی عمدۀ بود که با نتایج ساکیلا و همکاران (Sakila *et al.*, 2000) مشابه ولی با نتایج منصوری و احمدی (Mansouri and Ahmadi, 1998) و مورتی (Murty, 1975) همانگی نداشت. در هر دو

این صفت در گروه وراثت‌پذیری متوسط (Johnson *et al.*, 1955) طبقه‌بندی شد. در هر دو شرایط وراثت‌پذیری عمومی در گروه وراثت‌پذیری بالا قرار گرفت. در شرایط آبیاری، عمل افزایشی ژن‌ها بسیار قابل توجه بود و در برنامه‌های بهنژادی می‌تواند مورد استفاده واقع شود، ولی در شرایط قطع آبیاری، عمل غیر افزایشی ژن‌ها نقش بیشتری داشت. در شرایط آبیاری به صورت متوسط بین آلل‌های ژن‌های کنترل کننده این صفت، رابطه غالیت ناقص اما در شرایط قطع آبیاری رابطه فوق غالیت حاکم بود. بر مبنای این نتایج، برای این صفت در شرایط قطع آبیاری استفاده از گزینش برای بهبود این صفت مناسب نیست.

**طول دوره گل‌دهی:** در شرایط آبیاری نقش عمدۀ اثر ژن‌ها افزایشی بود اما در شرایط محدودیت آبیاری، نوع اثر غیر افزایشی ژن‌ها نقش بیشتری داشت. وراثت‌پذیری خصوصی در شرایط آبیاری، در گروه وراثت‌پذیری بالا و در شرایط محدودیت آبی، در گروه وراثت‌پذیری کم طبقه‌بندی شد. بر اساس برآورد بین آلل‌های ژن‌های دخیل در کنترل این صفت در شرایط آبیاری رابطه غالیت ناقص و در شرایط محدودیت آبیاری رابطه فوق غالیت وجود داشت.

**تعداد روز تا رسیدن کپسول:** در شرایط آبیاری نتایج نشان‌دهنده نقش برجسته عمل افزایشی ژن‌ها بود که با نتایج سینگ (Singh *et al.*, 1983)، فاتح و همکاران

کنترل این صفت به صورت میانگین بود. در شرایط محدودیت آبی برآورده حاکی از نقش برجسته عمل غیر افزایشی ژن‌ها در کنترل این صفت و وراثت‌پذیری عمومی در گروه وراثت‌پذیری بالا بود ولی وراثت‌پذیری خصوصی بسیار کم برآورده شد. تفاوت بین محیط اجرای این پژوهش با محیط اجرای برخی پژوهش‌های مشابه و تفاوت در مواد ژنتیکی و نیز روش دی‌آلل مربوطه (یک طرفه یا دوطرفه) می‌تواند از عوامل بروز اختلاف در نتایج به شمار آید.

**ارتفاع اولین کپسول:** در شرایط آبیاری، این صفت بیشتر تحت اثر عمل غیر افزایشی ژن‌ها بود. این نتیجه با نتایج ساکيلاو همکاران (Sakila *et al.*, 2000) هماهنگی داشت. در شرایط محدودیت آبیاری، کنترل این صفت تحت اثر افزایشی و غیر افزایشی ژن‌ها اهمیت نسبی گرچه عمل غیر افزایشی ژن‌ها اهمیت نسبی بیشتری دارند. در هر دو شرایط اجرای آزمایش، وراثت‌پذیری خصوصی در حد متوسط و وراثت‌پذیری عمومی این صفت بالا برآورده شد. در هر دو شرایط آبیاری و محدودیت آبی به صورت میانگین بین آلل‌های ژن‌های دخیل در کنترل این صفت رابطه فوق غالب وجود داشت.

**ارتفاع شاخه اصلی زاینده:** در هر دو شرایط آزمایش، واریانس ترکیب‌پذیری عمومی بسیار محدود و بر همین مبنای واریانس افزایشی بسیار اندک و وراثت‌پذیری خصوصی نیز در حد

شرایط، وراثت‌پذیری خصوصی پایین و وراثت‌پذیری عمومی بالا برآورده شد که با نتایج موتیلال و مانوهاران (Mothilal and Manoharan, 2004) هماهنگی نداشت. درجه متوسط غالبیت حاکی از وجود رابطه فوق غالبیت به صورت میانگین بین آلل‌های ژن‌ها در دخالت کننده در اداره این صفت در هردو شرایط اجرای بررسی بود که با نتایج سیونگ ولی (Seong and Lee, 1987) هماهنگی نداشت. در شرایط محدودیت آبی نیز نقش اثر غیر افزایشی ژن‌ها در هدایت این صفت عمده بود.

**تعداد کپسول در شاخه اصلی:** در شرایط آبیاری، بیشترین سهم از واریانس فنوتیپی مربوط به جزء افزایشی و بیانگر این بود که گزینش می‌تواند به عنوان راهکاری برای افزایش این صفت مورد استفاده قرار گیرد. این نتایج با گزارش منصوری و احمدی (Mansouri and Ahmadi, 1997) و اال براما شaban (El-Bramawy and Shaban, 2007) هماهنگی بود. وراثت‌پذیری عمومی و خصوصی هردو در گروه وراثت‌پذیری بالا طبقه‌بندی شد که با نتایج میشرا و یاداو (1997) متفاوت بود. در بین صفات مطالعه شده بیشترین وراثت‌پذیری خصوصی مربوط به صفت تعداد کپسول در شاخه اصلی بود. همچنین بررسی درجه متوسط غالبیت ژن‌ها بیانگر وجود رابطه غالبیت ناقص بین آلل‌های دخالت کننده در

آللهای ژنهای دخیل در اداره این صفت به صورت متوسط رابطه فوق غالبیت وجود داشت که با نتایج سیونگ (Seong, 1987) توافق داشت.

**وزن هزار دانه:** در شرایط آبیاری، کنترل صفت وزن هزار دانه نقش عمل افزایشی ژنهای بیشتر بود، که با نتایج کامالا (Kamala, 1999) و Mishra and Yadav (1996) و میشرا و یاداو (Kumar *et al.*, 2011) کومار و همکاران (Mansouri and Ahmadi, 1997) و فاتح (El-Bramawy and Shaban, 2007) و همکاران (Fatteh *et al.*, 1995) متفاوت بود. همچنین وراثت پذیری عمومی بالا و وراثت پذیری خصوصی در حد متوسط برآورد شد. بین آللهای ژنهای دخیل در کنترل این صفت به صورت میانگین رابطه غالبیت ناقص حاکم بود. گزینش در تنوع موجود برای این صفت در شرایط آبیاری می‌تواند در فرایند بهنژادی مفید وافع شود. در شرایط محدودیت آبی نقش عمل غیر افزایشی ژنهای بیشتر بود و به صورت میانگین بین آللهای ژنهای دخالت کننده در کنترل این صفت، رابطه فوق غالبیت وجود داشت. وراثت پذیری عمومی صفت وزن هزار دانه بالا و وراثت پذیری خصوصی در حد کم (پایین) بود. در فرایند اصلاحی در شرایط یاد شده، استفاده از این صفت توصیه نمی‌شد.

**عملکرد شاخه اصلی:** در شرایط آبیاری، در

پایین و نشان‌دهنده نقش بارز عمل غیر افزایشی ژنهای بود. وراثت پذیری عمومی در گروه وراثت پذیری بالا طبقه‌بندی شد. بررسی درجه متوسط غالبیت در هردو شرایط نشان داد که بین آللهای ژنهای کنترل این صفت به طور میانگین رابطه فوق غالبیت حاکم بود.

**قطر شاخه:** در شرایط آبیاری، عمل غیر افزایشی ژنهای در این صفت نقش بیشتری داشت و استفاده از گزینش برای بهبود آن به رغم اثرگذاری با کندی همراه خواهد بود. وراثت پذیری عمومی در حد بالا ولی صورت میانگین بین آللهای ژنهای دخیل در کنترل این صفت، رابطه فوق غالبیت وجود داشت. در شرایط محدودیت آبیاری به دلیل غیر معنی دار بودن تنوع صفت قطر ساقه در تجزیه واریانس اولیه، سایر برآوردها امکان‌پذیر نبود.

**تعداد دانه در کپسول:** در دو شرایط آبیاری و محدودیت آبیاری، قسمت عمده واریانس فوتیبی مربوط به جزء غالبیت بود و بیان کننده اهمیت بیشتر عمل غیر افزایشی ژنهای بود که با نتایج کومار و همکاران (Kumar *et al.*, 2012) گویا و سادین (Goyal and Sudhin, 1991) مشابهت دارد. وراثت پذیری عمومی بالا و وراثت پذیری خصوصی در محدوده ضعیف یا کم قرار داشت که با نتایج سولانکی و پالیوال (Solanki and Paliwal, 1981) متفاوت بود. بررسی درجه متوسط غالبیت نشان داد که بین

صغر برآورد شد و واریانس غالیت بیشتر و سهم آن در واریانس فتوتیپی نیز بیشتر بود. وراثت پذیری خصوصی بسیار کم و وراثت پذیری عمومی در گروه بالا قرار گرفت. نسبت ناچیز واریانس ترکیب پذیری عمومی به خصوصی به این معناست که عمل غیر افزایشی ژن‌ها نقش برجسته و تمام کننده‌ای را در کنترل این صفت دارد، بنابراین، برای بهبود صفت عملکرد در شرایط محدودیت آبی، گزینش توفیق چندانی نداشت و باستی در شرایط آبیاری به گزینش مبادرت کرد.

**طول کپسول:** در هر دو شرایط آبیاری و محدودیت آبی نقش عمل غیر افزایشی ژن‌ها در کنترل این صفت بیشتر بود که با نتایج دواراج (Devaraj, 1996) و پادماواتی (Padmavathi, 1999) هماهنگ ولی با نتایج کوتکا ویرمانوس (Kotecha and Yermanos, 1978) تفاوت داشت. همچنین وراثت پذیری عمومی این صفت زیاد ولی وراثت پذیری خصوصی در حد کم بود. بین آلل‌های ژن‌های دخیل در کنترل این صفت به صورت میانگین رابطه فوق غالیت وجود داشت. در هر دو شرایطی احتمالاً استفاده از گزینش بهبود این صفت را در زمان کوتاه به صورت بارزی به دنبال نخواهد داشت.

**طول میانگره:** در شرایط آبیاری، بیشترین سهم در واریانس فتوتیپی مربوط به واریانس محیطی بود و در جزء ژنتیکی واریانس غالیت نقش بیشتری داشت. وراثت پذیری عمومی در

مقایسه مقدار واریانس ترکیب پذیری عمومی و خصوصی تقریباً معادل و در توازن ولی نوع عمل ژن‌ها بیشتر غیرافزایشی بود، هر چند مقدار یاد شده بسیار به هم نزدیک و نسبت برآورد شده تفاوت اندکی با عدد یک داشت. مقدار وراثت پذیری خصوصی با حدود ۵۴ درصد در گروه متوسط و وراثت پذیری عمومی با برآورد ۹۴ درصد در گروه بالا قرار گرفت. این نتایج با نتایج مانوهاران و همکاران (Manoharan *et al.*, 1989) و ساکیلا (Sakila *et al.*, 2000) در توافق ولی با گزارش‌های منصوری و احمدی (Mansouri and Ahmadi, 1998) و گانسان (Manivaran and Ganesan, 2001) و داس و گوپتا (Das and Gupta, 1999) متفاوت بود. بین آلل‌های ژن‌های دخیل در کنترل این صفت به طور میانگین رابطه فوق غالیت وجود داشت. این نتایج متفاوت با نتایج اعلام شده کیم و همکاران (Kim *et al.*, 2007) بود. در شرایط آبیاری استفاده از روش گزینش با توجه به مقدار بسیار نزدیک واریانس‌های ترکیب پذیری عمومی و ترکیب پذیری خصوصی و نیز مقدار وراثت پذیری خصوصی متوسط می‌تواند کاربرد ملموسی داشته باشد. البته پایین بودن سرعت و کندی پیشرفت دور از انتظار نیست و انتخاب در نسل‌های متوالی نیازمند تکرار است. در شرایط محدودیت آبی، واریانس افزایشی و وراثت پذیری خصوصی بسیار ناچیز و معادل

شرایط محدودیت آبی، وراثت پذیری عمومی بالا و وراثت پذیری خصوصی پایین بود. سهم نوع عمل افزایشی و غیرافزایشی ژن‌ها تقریباً برابر بود و به صورت متوسط بین آلل‌های ژن‌های دخیل در کنترل این صفت رابطه فوق غالیت کاذب وجود داشت.

**تعداد کل گره:** در شرایط آبیاری و محدودیت آبی، نوع عمل غیرافزایشی ژن‌ها اهمیت بیشتری داشت. در هر دو شرایط، وراثت پذیری عمومی برای این صفت بالا بود. وراثت پذیری خصوصی در شرایط آبیاری متوسط و در شرایط محدودیت آبی پایین بود. بین آلل‌های ژن‌های دخیل در کنترل این صفت به صورت میانگین در هر دو شرایط رابطه فوق غالیت وجود داشت. در شرایط آبیاری، روش اصلاحی گزینش می‌تواند در بهبود این صفت موثر باشد اما در شرایط محدودیت آبی احتمال موفقیت کمتر است.

در مجموع، بر اساس منابع موجود و تجربه تحقیق اخیر، برای ارزیابی پارامترهای ژنتیکی با تعداد وسیع صفات در دو شرایط زیستی کاملاً مختلف در گیاه کنجد برای اولین بار در جهان محقق شده است. در شرایط آبیاری، در اغلب صفات با توجه به توازن یا برتری واریانس ترکیب‌پذیری عمومی به خصوصی، گزینش می‌تواند به عنوان راهکاری برای افزایش ارزش صفات در نسل‌های بعد مورد استفاده قرار گیرد. در شرایط محدودیت آبی صفات بیشتر از اثر غالیت ژن‌ها تاثیر می‌پذیرند و به گزینش پاسخ

حد متوسط و وراثت پذیری خصوصی در حد پایین یا کم بود و بر این مبنای در شرایط یاد شده استفاده از انتخاب در این صفت بازده ژنتیکی ملموسی به همراه نخواهد داشت. بررسی درجه متوسط غالیت حاکی از وجود رابطه فوق غالیت بین آلل‌های ژن‌های دخالت کننده در هدایت این صفت به صورت متوسط بود. در شرایط محدودیت آبی، به دلیل غیرمعنی داری تنوع در صفت طول میانگرۀ در تجزیه واریانس اولیه، سایر برآوردها امکان‌پذیر نبود.

**تعداد گره غیر زاینده:** در هر دو شرایط واریانس ترکیب‌پذیری خصوصی در مقایسه با واریانس ترکیب‌پذیری عمومی و واریانس خطای مقدار بیشتر و وراثت پذیری عمومی بالا برآورد شد. در شرایط آبیاری، وراثت پذیری خصوصی پایین و در شرایط محدودیت آبی متوسط برآورد شد. نسبت واریانس ترکیب‌پذیری عمومی به خصوصی بیان کننده اهمیت بیشتر عمل غیرافزایشی ژن‌ها بود. بین آلل‌های ژن‌های دخیل در کنترل این صفت به صورت متوسط رابطه فوق غالیت وجود داشت.

**تعداد گره زاینده کپسول:** در شرایط آبیاری، نوع عمل غیرافزایشی ژن‌هادارای اهمیت بیشتری بود.

وراثت پذیری عمومی بالا و وراثت پذیری خصوصی متوسط برآورد شد که با نتایج میشرا و یاداو (۱۹۹۷) مطابقت داشت. به صورت متوسط، بین آلل‌های ژن‌های دخیل در کنترل این صفت رابطه فوق غالیت وجود داشت. در

شده در باره نوع اثر و عمل ژن در دو شرایط آبیاری و محدودیت آبی مشهود و نیازمند تحلیل کامل‌تر با استفاده از اطلاعات دقیق‌تر در پژوهش‌های آتنی است.

خوبی نشان نداده و براین اساس، برای دستیابی به ژنوتیپ‌های متحمل به خشکی ضرورتی برای انجام پژوهش مربوطه در شرایط خشکی وجود ندارد و قابل توصیه نیست. تغییر رفتار ژن‌ها در تغییر شرایط محیطی با توجه به مشاهدات انجام

## References

- Acevedo, E., and Ceccarelli, S. 1989.** Role of the physiologist-breeder in a breeding program for resistance conditions. pp. 119-132. In: Baker, F. W. G. (ed.), Drought Resistance in Cereals. C. A. B. International, Wallingford, UK.
- Ahmadi, M. R. 1990.** Genetic Characteristics and Breeding Approachs for Soybean, Peanut and Sesame. Published by Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran. 32 pp. (in Persian).
- Ahmadi, M. R., Farrokhi, E., Agharokh, B., Khiavi, M., Mohammadi, A., Arab, G., and Andarkhor, A. 2001.** Registration of sesame (*Sesamum indica*) cultivar, Yekta. Seed and Plant 16 (3): 390-392 (in Persian).
- Anbanandan, V., Anbuselvam, Y., and Ganesan, J. 2006.** Genetic architecture of yield and its components in sesame (*Sesamum indicum L.*). Sesame and Safflower Newsletter 21: 36-39.
- Anonymous 2014.** Year book (<http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor>).
- Ashri, A. 1998.** Sesame breeding. Plant Breeding Review 16: 179-218.
- Banerjee, P. P., and Kole, P. C. 2009.** Analysis of genetic architecture for some physiological characters in sesame (*Sesamum indicum L.*). Euphytica 168: 11-22.
- Belhassen, E. 1997.** Drought Tolerance in Higher Plants (Genetical Physiological and Molecular Biological Analysis). Kluwer Academic Publishers, Amesterdam, The Netherlands.
- Bushuk, W., Jana, S., and Townley, T.F. 1989.** Canadian research on drought resistance in cereals. pp. 197-207. In: Baker, F. W. G. (ed.) Drought Restance in Cereals. C. A. B. International, Wallingford, UK.
- Das, S., and Gupta, T. 1999.** Combining ability in sesame. Indian Journal of Genetic and Plant Breeding 59: 69-75.

- Devaraj, N. 1996.** Combining ability analysis in sesame (*Sesamum indicum* L.). MSc. Thesis, University of Agricultural Science, Bangalore, India.
- Ding, F. Y., Jiang, J. P., Zhang, D. X., and Lee, G. S. 1993.** A study on relationship between heterosis and effects of combining ability in Sesame. Plant Breeding Abstracts 63 (5): 686.
- Eack, H. V. 1996.** Effect of water deficit on yield and yield components and water use efficiency of irrigation. Agronomy Journal 78: 1083-1089.
- El-Bramawy, M. A. S., and Shaban, W. I. 2007.** Nature of gene action for yield, yield components and major diseases resistance in sesame (*Sesamum indicum* L.). Research Journal of Agriculture Biological Science 3: 821-826.
- Fatteh, U. G., Patel, N. A., Chaudhari, F. P., Dangaria, C. I., and Patel, P. G. 1995.** Heterosis and combining ability in sesame (*Sesamum indicum* L.). Journal of Oil Seeds Research 12: 184-190.
- Goyal, S. N., and Sudhin, K. 1991.** Combining ability for yield components and oil content in sesame. Indian Journal of Genetics and Plant Breeding 51: 311-314.
- Griffing, B. 1956a.** A generalized treatment of the use of diallel crosses in quantitative inheritance. Heredity 10: 37-50.
- Griffing, B. 1956b.** Concepts of general and specific combining ability in relation to diallel crossing systems. Australian Journal Biological Science 9: 463-93.
- Johnson, H W., Robinson, H. F., and Comstac, R.E. 1955.** Genotypic and phenotypic correlation in soybean and their implications in selection. Agronomy Journal 47: 477-483.
- Kamala, T. 1999.** Gene action for seed yield and yield components in sesame (*Sesamum indicum* L.). Journal of Agricultural Sciences 69: 73-74.
- Kavitha, M., Sethupathi, R. R., and Raveendran, T. S. 1999.** Combining ability in sesame (*Sesamum indicum* L.). Journal of Oil Seeds Research 16: 27-31.
- Khorgadeh, P. W., Deshmukh, A. V., Narkhede, M. N., and T. S. K. 1989.** Combining ability for yield and its components in sesame. Journal of Maharashtra Agricultural Universities 14(2): 164-166.
- Kim, D. H., Kang, C. W., Shim, K. B., Park, C., and Lee, S. W. 2007.** Genetic analysis of shattering habit and some quantitative characters in sesame. Korean Journal of Crop Science 52(2): 198-203.

- Kotecha, A., and Yermanos, D.K. 1978.** Combining ability of seed yield, plant height, capsule number and capsule length in an  $8 \times 8$  diallel cross of sesame. *Agronomy Abstracts*. Page 55.
- Kumar, P., Madhusudan, K., Nadaf, H. L., Patil, R. K., and Deshpande, S. K. 2012.** Combining ability and gene action studies in inter-mutant hybrids of sesame (*Sesamum indicum* L.). *Karnataka Journal of Agricultural Sciences* 25 (1): 1-4.
- Langham, D. R., and Weimers, T. 2002.** Progress in mechanizing sesame in the US through breeding. pp. 157-173. In: Janick, J., and Whipkey, A. (eds.) *Trends in New Crops and New Uses*. ASHS, Atlanta, USA.
- Manivaran, N., and Ganesan, T. 2001.** Line  $\times$  tester analysis in sesame (*Sesamum indicum* L.). *Indian Journal of Agricultural Research* 35: 90-94.
- Manoharan, V., Sethupathi Ramaligan, R., and Kandasamy, G. 1989.** Line  $\times$  tester analysis of heterosis and combining ability in sesame. *Sesame and Safflower Newsletter* 4: 15-17.
- Mansouri, S., and Ahmadi, M. R. 1998.** Study of combining ability and gene effects on sesame lines by diallel cross method. *Iranian Journal of Agricultural Sciences* 29: 47-54.
- Mishra, A. K., and Yadav, L. N. 1996.** Combining ability and heterosis in sesame. *Journal of Oil Seeds Research* 13: 88-92.
- Mishra, A. K., and Yadav, L. N. 1997.** Variability, heritability and genetic advance for different populations in sesame. *Sesame and Safflower Newsletter* 12: 80-83.
- Mothilal, A., and Manoharan, V. 2004.** Heterosis and combining ability in sesame (*Sesamum indicum* L.). *Crop Res.*, Hisar 27(2/3): 282-287.
- Mothilal, A., and Manoharan, V. 2005.** Diallel analysis for the estimation of genetic parameters in sesame (*Sesamum indicum* L.). *Indian Agricultural Science Digest*, Annual Report, Tamil Nadu Agricultural University, India 25( 2).
- Murty, D. S. 1975.** Heterosis combining ability and reciprocal effect for agronomic and chemical characters in sesame. *Theoretical and Applied Genetics* 45: 294-299.
- Padmavathi, N. 1999.** Heterosis in relation to combining ability for seed yield and its contribution traits in sesame. *Journal of Oil Seeds Research* 16: 18-21.
- Sakila, M., Ibrahim, S. M., Kalamani, A., and Backiyarani, S. 2000.** Evaluation of sesame hybrids through line  $\times$  tester analyses. *Sesame and Safflower Newsletter*

15: 1-5.

- Seong, N. S. Lee, J. I. 1987.** Inheritance of major agronomic characteristics in sesame (*Sesamum indicum* L.). Korean Journal of Breeding 19: 399-403.
- Singh, V. K., Singh, H. G., and Chauhan, Y. S. 1983.** Combining ability in sesame. Indian Journal Agricultural Sciences 53: 305-310.
- Solanki, E. S., and Paliwal, R. S. 1981.** Genetic variability and heritability studies on yield and its components in sesame. Indian Journal of Agricultural Science 8: 554-556.
- Tabanao, D. A., and Bernardo, R. 2005.** Genetic variance and interrelationships of six traits in a hybrid population of *Zea mays* L. Crop Science 6: 455-458.
- Verhalen, L. M., and Murty, J. C. 1967.** A diallel analysis of several fiber property traits in upland cotton. Crop Science 7: 501-505.