

تنوع ژنتیکی در ژرمپلاسم گلرنگ بانک ژن گیاهی ملی ایران

Genetic Diversity in Safflower Germplasm of National Plant Gene Bank of Iran

محمد عباسعلی^۱ و مهدی زهراوی^۲

۱ و ۲- به ترتیب مریمی و استادیار، بانک ژن گیاهی ملی ایران، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۳/۱۸ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۹/۲۵

چکیده

Abbasali, M. and Zahraoui, M. 2017. Genetic diversity in safflower germplasm of National Plant Gene Bank of Iran. *Mahanjehi*, 32(3), 1395-531-547.

10.22092/spij.2017.113087

گلرنگ یکی از گیاهان مناسب برای تولید روغن در مناطق خشک است و با توجه به تغییرات اقلیم در چند سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. پایه ژنتیکی و ژرمپلاسم غنی برای اصلاح این گیاه ضرورت دارد. این تحقیق در سال ۱۳۹۰ با هدف بررسی تنوع ژنتیکی ۳۴۵ نمونه از کلکسیون ژرمپلاسم گلرنگ بانک ژن گیاهی در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج انجام شد، نتایج اولیه نشان داد بسیاری از نمونه‌ها دارای مورفوتیپ‌های متنوع بودند و با جداسازی و تعیین مورفوتیپ‌ها، در مجموع ۵۳۴ نمونه ژنتیکی به دست آمد که به صورت مشاهده‌ای مورد مطالعه قرار گرفتند. رنگ جام گل و میزان خارداری برآکته مقادیر قابل توجهی از شاخص شانون را به خود اختصاص دادند. عملکرد دانه تک بوته، بزرگ‌ترین (۸۵/۶۲ درصد) و روز تا گلدۀی (۷/۲۴) کوچک‌ترین، ضریب تغییرات را دارا بودند. در تجزیه به مؤلفه‌های اصلی، ۵۶/۱۳ درصد از تغییرات، توسط سه مؤلفه اول توجیه شد. مؤلفه‌های اول و دوم به ترتیب بیانگر اجزاء عملکرد و اجزاء رویشی بودند. تجزیه خوش‌ای به روش K means، با تشکیل پنج گروه، نمونه‌های مورد بررسی را از یکدیگر متمایز کرد. پراکنش مبداء نمونه‌های ژنتیکی در نمودار بای‌پلات حاصل از مقیاس‌بندی چند بعدی در برخی موارد با موقعیت جغرافیایی آن‌ها مطابقت داشت. به طور کلی نتایج نشان داد که در ژرمپلاسم گلرنگ تنوع قابل توجهی وجود دارد که می‌تواند در برنامه‌های بهنژادی قابل استفاده باشد.

واژه‌های کلیدی: گلرنگ، بانک ژن گیاهی ملی ایران، مورفوتیپ، نمونه ژنتیکی.

مقدمه

گلنگ از خانواده Asteracea است. هند، افغانستان و اتیوبی به عنوان خاستگاه این گیاه شناخته شده است (Vavilov, 1951). موطن احتمالی گلنگ اهلی منطقه‌ای محصور میان مدیترانه شرقی و خلیج فارس است (Knowles, 1969). گلنگ از دیرباز در خراسان، آذربایجان و اصفهان به صورت زراعت فرعی و با هدف تهیه رنگ از گلبرگ آن کشت می‌شده است. ایران یکی از غنی‌ترین مناطق ذخایر ژنتیکی گونه‌های زراعی و وحشی گلنگ است (Carthamus tinctorius L.). جنس (Khajehpour, 2004) شامل ۲۵ گونه است و تنها گونه کشت می‌شود (Ashri and Knowles, 1960; Patel and Narayana, 1935; Richharia and Kotval, 1940; Kumar et al., 1981). گونه C. oxyacatatha Bieb گونه زراعی، در اکثر نقاط ایران پراکنده است و تلاقی طبیعی بین آن و گونه زراعی در اطراف اصفهان و در مزرعه‌ای آزمایشی در بغداد مشاهده شده است (Singh, 2006).

هند دارای بزرگ‌ترین کلکسیون گلنگ، در قالب دو کلکسیون مجزا، به تعداد ۷۵۲۵ و ۲۳۹۳ نمونه است و آمریکا نیز دارای دو کلکسیون به تعداد ۲۲۸۸ و ۱۹۶۴ نمونه از گلنگ زراعی و گونه‌های متفاوت جنس (Anonymous, 2015).

گلنگ (*Carthamus tinctorius* L.)، از گیاهان صنعتی است که از گذشته‌های دور با هدف تولید ماده رنگی، در ایران کشت و کار می‌شده است (Koocheki and Khajeh Hosseini, 2008). رنگ آن برای غذا و رنگ‌آمیزی پارچه و ابریشم استفاده می‌شود (Khajehpour, 2004) و گل‌های آن کاربرد پزشکی و درمانی دارد (Singh, 2006). مهم‌ترین مصرف فعلی آن تهیه روغن است. علی‌رغم تحمل بالا به کم آبی، ترکیب اسیدهای چرب و کیفیت مناسب روغن، از نظر تغذیه و مصارف صنعتی و پزشکی، کشت گلنگ کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. این گیاه با دارا بودن خصوصیات ویژه، با توجه به تغییر اقلیم و بحران آب، می‌تواند جایگاه مناسبی در الگوی کشت مناطق خشک جهان و ایران داشته باشد (Koocheki and Khajeh Hosseini, 2008).

کشورهای هند، مکزیک، قزاقستان، آمریکا و آرژانتین طی دهه گذشته بیشترین سطح زیر کشت گلنگ را داشته‌اند. سطح کشت جهانی آن در سال ۲۰۱۳ برابر ۷۸۲۶۴۱ هکتار با میانگین عملکرد ۸۲۷ کیلوگرم در هکتار بوده است. قزاقستان بیشترین سطح زیر کشت به میزان ۲۷۶۵۰۰ هکتار و با میانگین عملکرد ۶۳۲ کیلوگرم در هکتار را در اختیار دارد، سطح زیر کشت در ایران در سال ۲۰۱۳ برابر ۸۱۰ هکتار و میانگین عملکرد ۶۹۱ کیلوگرم در

نشان داد (Dwivedi *et al.*, 2005). ارزیابی عمومی ژرمپلاسم شامل صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و زراعی، از اهم بررسی های مواد ژنتیکی و تشکیل بانک اطلاعاتی پایه است. تحقیق و توسعه جنبه های مختلف گلرنگ، با وجود سازگاری آن به شرایط متنوع رشد و پتانسیل عملکرد بسیار بالا و تنوع استفاده از بخش های مختلف آن، مورد توجه کافی قرار نگرفته است. در فرآیند اصلاح، داشتن مواد ژنتیکی غنی که از جنبه های مختلف شناسایی شده، ضروری است، این تحقیق، با چنین هدفی به بررسی صفات مورفولوژیک و فنولوژیک قسمتی از ژرمپلاسم گلرنگ بانک ژن گیاهی ملی ایران پرداخت.

مواد و روش ها

در این تحقیق ۳۴۵ نمونه ژنتیکی از کلکسیون ژرمپلاسم گلرنگ بانک ژن گیاهی ملی ایران، عمدتاً دریافتی از سازمان خوار و بار و کشاورزی (FAO)، مورد ارزیابی قرار گرفتند. مواد ژنتیکی مذکور در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ در مزرعه بخش تحقیقات ژنتیک و ذخایر توارثی در کرج با مختصات جغرافیایی طول ۵۰ درجه و ۵۹ دقیقه شرقی و عرض ۳۵ درجه و ۵۲ دقیقه شمالی و ارتفاع ۱۳۲۱ متر از سطح دریا، به صورت مشاهده ای مورد کشت و بررسی قرار گرفتند. هر نمونه در سه خط دو متري با فاصله ۵۰ سانتي متر بين ردیف و ۷-۵ سانتي متر روی ردیف کاشته شد. داشت

مریوطه است که از ۵۰ کشور جمع آوری شده اند (Zhang and Johnson, 1999) بانک ژن گیاهی ملی ایران دارای ۸۱۹ نمونه ژنتیکی گلرنگ است، از این تعداد ۵۳۹ نمونه از گونه زراعی و بقیه از خویشاوندان وحشی آن هستند. جمع آوری توده های بومی و ارقام و لاین های گلرنگ از سراسر کشور از سال ۱۳۸۰ و نیز وارد کردن ژنو تیپ های گلرنگ از بانک جهانی گلرنگ سبب شد تا بزرگ ترین کلکسیون خاورمیانه با حدود ۳۵۰۰ نمونه در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایجاد شود (Pourdad, 2000). در بررسی ۲۷۰ نمونه ژنتیکی گلرنگ در شرایط دیم، تجزیه خوش ای برای صفات، ژنو تیپ ها را در پنج گروه قرار داد (Jamshid-Moghadam *et al.*, 2006) بررسی ۸۱ نمونه ژنتیکی گلرنگ بانک ژن گیاهی ملی ایران، تنوع قابل توجهی مشاهده شد. در این تحقیق ضریب تنوع شانون برای صفات رنگ خار برآکته، و بافت برگ کم ترین و تراکم خار برگ، طول شاخه، محل شاخه، و ریزش دانه بیشترین مقدار را داشت (Abbasali *et al.*, 2006). با بررسی ۵۵۲۲ نمونه گلرنگ و تجزیه خوش ای برای صفات مورفولوژیک و جغرافیایی، پس از جداسازی تصادفی ده درصد از نمونه ها از ۲۵ گروه حاصل، کلکسیون هسته (Core collection) تشکیل داده شد و مقایسه میانگین داده ها و شاخص تنوع شانون (Shannon)، حفظ تنوع را در کلکسیون هسته

نسبی شناسه ام موردنظر از یک صفت و لگاریتم طبیعی است.

برای صفات کمی، پارامترهای آماری شامل میانگین و انحراف معیار، بیشینه و کمینه، محاسبه شد. ابعاد داده‌ها با استفاده از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی کاهش یافت. برای گروه‌بندی نمونه‌های K means ژنتیکی از تجزیه خوش‌ای به روش استفاده شد. پراکنش مبداء ژرمپلاسم مورد بررسی با استفاده از باقی‌پلات مبتنی بر مقیاس‌بندی چند بعدی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه‌های آماری با استفاده نسخه ۱۶ نرم‌افزار SPSS انجام شد.

نتایج و بحث

تعداد نمونه‌های ژنتیکی گلرنگ و کشورهای منشاء آن در جدول ۱ و صفات مورد ارزیابی برای مطالعه تنوع ژنتیکی نمونه‌ها در جدول ۲ نشان داده شده‌اند.

بر اساس شاخص شanon (جدول ۳)، نمونه‌های سودان (۱/۳۴)، مصر (۱/۳۱) و استرالیا (۱/۲۶) دارای بیشترین تنوع از نظر صفت رنگ جام بودند. این صفت در نمونه‌های آرژانتین، بنگلادش، بلغارستان، دانمارک، الجزیره، بریتانیا، ایتالیا، لبنان و سوئیس فاقد تنوع بود. نمونه‌های اکراین (۱/۱۰)، چین (۱/۰۸) و مصر (۱/۰۶) دارای بیشترین تنوع از نظر صفت خارداری برآکته بودند، در حالی که نمونه‌های تاجیکستان، فیلیپین، روسیه، آلمان، ایسلند و ایتالیا فاقد تنوع از نظر این صفت بودند.

محصول از جمله آبیاری، وجین علف‌های هرز و غیره، طبق نیاز گلنگ و با توجه به شرایط محیطی انجام شد.

بررسی مقدماتی ژرمپلاسم مورد ارزیابی نشان داد که در بسیاری از نمونه‌ها مورفو‌تیپ‌های متنوع وجود دارد و لذا بر اساس دستورالعمل مؤسسه بین‌المللی ذخائر توارثی گیاهی (Anonymous, 1981) به جداسازی نمونه‌ها و تعیین مورفو‌تیپ‌ها مبادرت شد. پس از جداسازی مورفو‌تیپ‌ها مشخص شد که از بین کل ژرمپلاسم مورد ارزیابی، ۲۲۱ نمونه ژنتیکی از چند تیپ مورفولوژیکی تشکیل شده بودند و ۱۲۴ نمونه ژنتیکی صرفاً متشکل از یک مورفو‌تیپ بودند. در مجموع تعداد کل نمونه‌های ژنتیکی به تعداد ۵۳۴ مورفو‌تیپ افزایش یافت و ارزیابی صفات روی این تعداد از نمونه‌های ژنتیکی انجام شد. خصوصیات مورد بررسی شامل صفات مورفولوژیکی رویشی، مشخصات بتانیکی برآکته‌های بیرونی، خواص مورفولوژیکی گل، و صفات مربوط به بذر بودند که بر اساس دستورالعمل مربوطه (Anonymous, 1981)، ارزیابی شدند.

تنوع صفات کیفی با استفاده از شاخص شanon (Shannon, 1948)، از طریق فرمول زیر اندازه‌گیری شد:

$$H = - \sum_{i=1}^S P_i \ln(P_i)$$

که در آن H شاخص تنوع شanon، P_i فراوانی

جدول ۱- کشورهای مبداء و تعداد نمونه‌های ژنتیکی مورد استفاده در بررسی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم گلرنگ

Table1. Origin and number of accessions used in study of genetic diversity of safflower

کشور Country	کد Code	تعداد نمونه Number of accessions	کشور Country	کد Code	تعداد نمونه Number of accessions	کشور Country	کد Code	تعداد نمونه Number of accessions
Netherlands	NLD	1	Great Britain	GBR	2	Argentina	ARG	2
Pakistan	PAK	16	Greece	GRC	1	Armenia	ARM	3
Philippines	PHL	2	Hungary	HUN	5	Australia	AUS	16
Poland	POL	6	India	IND	22	Bangladesh	BGD	7
Portugal	PRT	8	Iran	IRN	26	Bulgaria	BGR	2
Romania	ROM	3	Iraq	IRQ	8	Canada	CAN	2
Russia	RUS	2	Israel	ISR	15	China	CHN	19
Sudan	SDN	15	Italy	ITA	2	Cyprus	CYP	2
Sweden	SWE	2	Jordan	JOR	9	Germany	DDR	3
Syria	SYR	11	Japan	JPN	6	Denmark	DNK	2
Thailand	THA	1	Kazakhstan	KAZ	9	Algeria	DZA	2
Tajikistan	TJK	3	Kenya	KEN	6	Egypt	EGY	22
Turkmenistan	TUK	21	Korea	KOR	3	Eritrea	ERI	1
Ukraine	UKR	3	Kuwait	KWT	1	Spain	ESP	6
United States	USA	185	Libyan	LBY	2	Ethiopia	ETH	5
Uzbekistan	UZB	13	Morocco	MAR	8	France	FRA	8
Unknown	Unknown	6	Afghanistan	AFG	9			

جدول ۲- صفات مورد ارزیابی در مطالعه تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گلرنگ

Table 2. Evaluated traits in the study of genetic diversity of safflower germplasm

Traits and abbreviations	صفات و اختصار آنها	Measuring and unites	چگونگی اندازه گیری و واحدها
Days to %50 flowering, (DF)	روز تا گلدهی ۵۰٪ بوتهها	Number of days from planting or first irrigation to 50% of plants having first flower	تعداد روز از زمان کاشت با اولین آبیاری تا ایجاد گل در ۵۰٪ بوتهها
Corolla color of dry flower, (CCF)	رنگ جام گل تازه خشکیده	۱ Grey-white, 2 Pale yellow, 3 Yellow, 4 Light orange, 5 Orange base, 6 Orange, 7 Deep red, 8 Other	۱ سفید خاکستری، ۲ زرد کم رنگ، ۳ زرد، ۴ نارنجی کم رنگ، ۵ پایه نارنجی، ۶ نارنجی، ۷ قرمز پر رنگ، ۸ سایر
Spine intensity of outer involucral bracts, ISB)	شدت خارداری برآکته های بیرونی	۰ None, 1 very low, 3 low, 5 Intermediate, 7 High, 9 Very high	۰ بدون، ۱= خیلی کم، ۳= کم، ۵= متوسط، ۷= زیاد، ۹= خیلی زیاد
Plant height, (PH)	ارتفاع بوته	Mean of 5 random plants from the middle of the plot (cm)	میانگین ارتفاع ۱۰ بوته تصادفی از میان کرت (سانتی متر)
Plant seed weight, (PSW)	عملکرد تک بوته	Mean of 5 random plants from the middle of the plot (g)	میانگین وزن بذر ۱۰ بوته تصادفی (گرم)
Harvest Index, (HI)	شاخص برداشت	The weight ratio of seed to biomass (g)	درصد نسبت عملکرد به زیست توده مربوطه
Hundred seed weight, (HSW)	وزن صد دانه	Weight of 100 random seeds (g)	وزن صد دانه تصادفی (گرم)
Head (<i>capitulum</i>) number, (PHN)	تعداد غوزه در بوته	Mean of head number 10 random plants(cm)	میانگین تعداد قوزه در ۱۰ بوته تصادفی (سانتی متر)

جدول ۳- شاخص شانون برای صفات رنگ جام و خارداری برآکته بر اساس کشورهای مبدأ نمونه‌های ژنتیکی گلرنگ

Table 3. Shannon index for corolla color and spine intensity of outer involucral bracts based on the country of origin of safflower germplasm

مبدأ Origin	مبدأ Corolla color	رنگ جام Spine intensity	خارداری برآکته Origin	مبدأ Corolla color	رنگ جام Spine intensity	خارداری برآکته Origin	مبدأ Corolla color	رنگ جام Spine intensity	خارداری برآکته
	AFG	0.69	0.94	GBR	0.00	0.35	PHL	0.69	0.00
ARG	0.00	0.69	HTH	0.64	0.00	POL	0.64	0.87	
ARM	1.10	0.64	HUN	0.67	0.95	PRT	0.66	0.66	
AUS	1.26	0.78	IND	1.03	0.30	ROM	1.10	0.64	
BGD	0.00	0.96	IRN	1.02	0.97	RUS	0.69	0.00	
BGR	0.00	0.69	IRQ	0.69	0.66	SDN	1.34	0.49	
CAN	0.69	0.69	ISR	1.09	1.04	SWE	0.00	0.69	
CHN	1.06	1.08	ITA	0.00	0.00	SYR	0.93	0.86	
CYP	0.69	0.69	JOR	0.94	0.53	TJK	1.10	0.00	
DDR	0.64	0.00	JPN	0.69	0.64	TUK	1.05	0.93	
DNK	0.00	0.35	KAZ	1.15	1.00	UKR	0.64	1.10	
DZA	0.00	0.69	KEN	1.24	0.45	USA	1.22	0.94	
EGY	1.31	1.06	KOR	0.64	0.64	UZB	1.22	0.94	
ESP	0.87	1.01	LBY	0.00	0.69	Unknown	1.10	0.64	
ETH	0.00	0.00	MAR	0.56	0.66				
FRA	1.04	0.90	PAK	0.97	0.62				

برای نام کشورهای مبدأ به جدول ۱ مراجعه شود.

For abbreviations of country of origins see Table 1.

صفت روز تا ۵۰ درصد گلدهی دارای دامنه ۲۴ روز بود. نمونه ژنتیکی TN0511E (از پاکستان) دارای کمترین تعداد روز تا ۵۰ درصد گلدهی (۵۴ روز) بود. نمونه های ژنتیکی TN0597B، TN0597A، TN0595B و TN0597F (از ترکمنستان)، TN0597E (از کویت)، TN0594 (از فلسطین) و TN0591B (از چین)، TN0592A و TN0773 (از آرژانتین) با ۷۸ روز تا گلدهی، دیرگلده ترین مورفوتیپ ها بودند. نمونه ژنتیکی TN0484C (از فرانسه)، کوتاه ترین و نمونه ژنتیکی TN0679 (از ایالات متحده آمریکا)، بلند ترین ارتفاع بوته را داشتند. ارتفاع بوته در نمونه های ژنتیکی ایرانی، از ۵۷ تا ۸۷ سانتی متر، متغیر بود. نمونه های ژنتیکی TN0548 (با ۸/۷ گرم از سودان)، ۸/۷ گرم از سودان (با ۸/۵ گرم از لهستان) و TN0503A (با ۷/۸ گرم از سودان) دارای بیشترین مقدار وزن صد دانه بودند. مقدار وزن صد دانه در نمونه های ایرانی از ۲/۸ گرم تا ۶/۶ گرم متغیر بود.

نتایج تجزیه به مؤلفه های اصلی در جدول ۵ ارائه شده است. براساس این نتایج، سه مؤلفه اول ۱۳/۵۶ درصد از تغییرات در جمعیت مورد مطالعه را در برداشتند. مؤلفه اصلی اول ۲۵/۲۴ درصد از واریانس داده ها را توجیه کرد که در آن، بیشترین ضرایب به صفات وزن بذر یک بوته (۰/۸۶)، تعداد قوزه در بوته (۰/۶۴) و شاخص برداشت (۰/۵۹) اختصاص داشت. این

نمونه های مصر متنوع ترین ژرم پلاسم با در نظر گرفتن هر دو صفت رنگ جام و خارداری برآکته بودند. با توجه به اینکه دو صفت اخیر از بارز ترین صفات در نوع گلنگ زراعی هستند، این یافته با نظر وايس (Weiss, 1971) که سرزمین اولیه پرورش گلنگ را سرتاسر دره نیل تا اتیوپی می داند منطبق است. نمونه های قراقستان را می توان به عنوان مواد ژنتیکی با تنوع بالا، از نظر هر دو صفت مذکور نام برد، قابل ذکر است که قراقستان همیشه جزء ده کشور اول تولید کننده دانه گلنگ بوده و در سال ۲۰۱۳ اولین تولید کننده دانه گلنگ در جهان بود (Anonymous, 2015). از سوی دیگر، فقط نمونه های ایتالیا فاقد تنوع برای هر دو صفت رنگ جام و خارداری برآکته بودند. این نتایج نشان می دهد دو صفت مذکور از تغییرات کافی در جوامع مختلف برخوردار بوده و انتخاب آن ها برای مطالعه تنوع مناسب بوده است. براساس شاخص شانون، نمونه های با منشاء ایران دارای رتبه ۱۳ برای تنوع رنگ جام (۱/۰۲) و رتبه هفت برای تنوع خارداری برآکته (۰/۹۷) بودند. نتایج آماره های توصیفی برای جمعیت مورد مطالعه (جدول ۴) نشان داد که صفات عملکرد دانه تک بوته دارای بیشترین ۸۵/۶۲ (درصد) و روز تا ۵۰ درصد گلدهی ۷/۲۴ (درصد) دارای کمترین ضریب تغییرات بودند. همچنین صفات تعداد قوزه در بوته (۷۸/۷۰ درصد) و زیست توده (۷۷/۷۴ درصد) نیز از ضریب تغییرات بالایی برخوردار بودند.

جدول ۴- مقادیر آماره‌های توصیفی برای صفات مختلف ژرم‌پلاسم گلنگ

Table 4. Estimates of descriptive statistics for different traits of safflower germplasm

Trait	صفت	دامنه	حداقل	حداکثر	Mean	میانگین	انحراف استاندارد	درصد ضریب تغییرات
		Range	Minimum	Maximum	آماره Statistic	خطای معیار Std. Error		
Days to %50 flowering	روز تا گلدهی ۵۰٪ بوته‌ها	24.00	54.00	78.00	61.37	0.19	4.44	7.24
Plant height	ارتفاع گیاه	71.00	29.00	100.00	59.15	0.46	10.55	17.84
Plant seed weight	عملکرد تک بوته	59.70	0.60	60.30	11.67	0.43	9.99	85.62
Biomass	زیست‌نوع	1795.00	5.00	1800.00	421.62	14.18	327.77	77.74
Harvest Index	شاخص برداشت	63.75	0.45	64.20	17.94	0.41	9.47	52.80
Hundred seed weight	وزن صد دانه	6.70	2.00	8.70	4.08	0.04	0.88	21.67
Head (<i>capitulum</i>) number	تعداد قوزه در بوته	111.84	3.16	115.00	22.36	0.76	17.59	78.70

جدول ۵- تجزیه به مؤلفه‌های اصلی داده‌های حاصل از ارزیابی صفات مختلف در ژرمپلاسم گلرنگ

Table 5. Principal component analysis of data obtained from assessment of different traits of safflower germplasm

Trait	صفت	Principal component		
		1	2	3
Days to %50 flowering	روز تا گلدهی ۵۰٪ بوته‌ها	0.36	0.51	0.06
Plant height	ارتفاع گیاه	0.43	-0.02	-0.46
Plant seed weight	عملکرد تک بوته	-0.33	-0.16	0.65
Biomass	زیست توده	0.45	0.68	-0.05
Harvest Index	شاخص برداشت	0.86	-0.12	0.31
Hundred seed weight	وزن صد دانه	-0.22	0.70	0.19
Head (<i>capitulum</i>) number	تعداد قوزه در بوته	0.59	-0.28	-0.35
Days to %50 flowering	روز تا گلدهی ۵۰٪ بوته‌ها	-0.11	-0.47	-0.11
Plant height	ارتفاع گیاه	0.64	-0.24	0.60
Eigen values	مقادیر ویژه	2.18	1.60	1.27
Cumulative variance	درصد واریانس تجمعی	24.25	42.02	56.13

رو نمونه‌های ژنتیکی TN0773 (از چین)، TN0644 (از ایران)، TN0679 (از ایالات متحده آمریکا)، TN0600 (از ایران)، TN0645 (از ایران)، TN0591B (از کویت)، TN019A (از ایران) و TN0628A (از اکراین) با بیشترین مقدار برای این مؤلفه اصلی، از نظر صفات مذکور نسبت به سایر نمونه‌ها برتر بودند. نمونه‌های ژنتیکی برتر براساس مؤلفه‌های اصلی اول عبارت بودند از TN0553B (از پرتغال)، TN0487B (از استرالیا)، TN0574B (از هندوستان)، TN0629B (از روسیه)، TN0648C (از ترکمنستان) و TN0590B (از هندوستان). مؤلفه اصلی دوم ۱۷/۷۷ درصد از واریانس داده‌ها را دربر داشت. صفات زیست توده (۰/۷۰)، ارتفاع (۰/۶۸) و روز تا گلدهی (۰/۵۱) در این مؤلفه، بیشترین ضرایب به صفات خارداری برآکته داشت. مؤلفه اصلی سوم ۱۴/۱۱ درصد از واریانس داده‌ها را شامل شد. در این مؤلفه، بیشترین ضرایب به صفات خارداری برآکته (۰/۶۵) و تعداد قوزه در بوته (۰/۶۰) اختصاص داشت، لذا نمونه‌های ژنتیکی با بیشترین مقدار

مؤلفه اصلی بر عملکرد و اجزاء عملکرد تأکید داشت، از این رو نمونه‌های ژنتیکی با بیشترین مقدار برای این مؤلفه اصلی، از نظر سه صفت مذکور نسبت به سایر نمونه‌ها برتر بودند. نمونه‌های ژنتیکی برتر براساس مؤلفه‌های اصلی اول عبارت بودند از TN0553B (از پرتغال)، TN0487B (از استرالیا)، TN0574B (از هندوستان)، TN0629B (از روسیه)، TN0648C (از ترکمنستان) و TN0590B (از هندوستان). مؤلفه اصلی دوم ۱۷/۷۷ درصد از واریانس داده‌ها را دربر داشت. صفات زیست توده (۰/۷۰)، ارتفاع (۰/۶۸) و روز تا گلدهی (۰/۵۱) در این مؤلفه، بیشترین ضرایب را در مؤلفه اصلی دوم داشتند. این مؤلفه اصلی بر صفات رویشی و فنولوژیک تأکید داشت. از این

(Shinwari *et al.*, 2014). همچنین در تجزیه به عامل‌ها در بررسی تنوع ژنتیکی در کلکسیون گلرنگ در شرایط دیم، عامل اول و دوم به ترتیب ۲۶ درصد و ۱۵/۷ درصد تغییرات کل را توجیه کرد و در عامل اول صفات عملکرد دانه و روغن دارای بار عاملی بزرگ و به عنوان عامل عملکرد نامگذاری شد. در عامل دوم دو جزء عملکرد یعنی تعداد دانه در غوزه و تعداد غوزه در بوته دارای بارهای عاملی بزرگ و مثبت بودند و به عنوان عامل اجزایی عملکرد نامگذاری شد (Pourdad and Jmshid-Moghaddam, 2013). نتایج تجزیه به عامل‌ها در بررسی تنوع ۵۸ نمونه گلرنگ، صفات عملکرد دانه و روغن در عامل اول، تعداد شاخه فرعی و تعداد قوزه در بوته در عامل دوم و روز تا ۵۰٪ گلدهی در عامل سوم تأکید داشت (Hatamzadeh, 2008). نتایج تجزیه به عامل‌ها روی یک صد ژنوتیپ گلرنگ نشان داد که عامل اول ۲۸ درصد از واریانس کل را توجیه کرد و متغیرهای روز تا اولین گلدهی، روز تا ۵۰ درصد گلدهی، روز تا پایان گلدهی و ارتفاع بوته نقش مهمی در این عامل ایفا کردند، عامل دوم ۱۸ درصد از واریانس کل را توجیه کرد که عملکرد دانه در بوته، تعداد قوزه در بوته و تعداد انشعاب در بوته دارای بیشترین بار عاملی در آن بودند (Maleki Nejad and Majidi, 2014).

نتایج تجزیه واریانس یک طرفه برای صفات کمی نشان داد که ژرمپلاسم مورد بررسی،

برای این مؤلفه اصلی، از نظر دو صفت مذکور نسبت به سایر نمونه‌ها برتری داشتند. نمونه‌های ژنتیکی برتر براساس مؤلفه‌های اصلی سوم عبارت بودند از TN0574B (از استرالیا)، TN0487B (از هندوستان)، TN0590B (از هندوستان)، TN0577B (از ازبکستان) و TN0744C (از ایالات متحده آمریکا). به منظور گرینش و متایز کردن نمونه‌های واجد رشد زایشی بیشتر (عملکرد و اجزاء عملکرد برتر) و رشد رویشی کمتر (زیست توده، ارتفاع بوته و روز تا گلدهی کمتر) باید مقادیر بزرگ‌تر براساس مؤلفه اصلی اول و مقادیر کوچک‌تر از مؤلفه اصلی دوم را مد نظر قرار داد. نمونه‌های ژنتیکی TN0505B (از مراکش)، TN0606B (از سودان)، TN0674B (از ایالات متحده آمریکا)، TN0545B (از مجارستان)، TN0487B (از هندوستان)، TN0722B (از قزاقستان)، TN0621B (از ایالات متحده آمریکا)، TN0577B (از ازبکستان)، TN0641B (از بنگلادش) و TN0673B (از ایالات متحده آمریکا) دارای ویژگی مذکور بودند و برای اهداف بهنژادی در این زمینه قابل توصیه هستند. در انجام تجزیه به مؤلفه‌های اصلی در بررسی ۱۲۲ نمونه ژنتیکی گلرنگ در پاکستان نتایج مشابهی به دست آمد به طوری که مؤلفه اول با توجیه ۲۶/۰۲ درصد کل واریانس دارای ضرایب بیشینه‌ای برای صفات عملکردی تعداد قوزه در بوته، تعداد دانه در قوزه، زمان گلدهی و عملکرد بود

کمترین میانگین تعداد قوزه در بوته و نمونه‌های آرژانتین و روسیه با بیشترین میانگین تعداد قوزه در بوته، به طور متمایز از نمونه‌های سایر کشورها قرار گرفتند.

در تجزیه خوش‌های به روش means K، با تشکیل پنج گروه، نمونه‌های مورد بررسی از یک دیگر متمایز شدند (جدول ۶). گروه اول با ۳۵ عضو، دارای کمترین میانگین بذر تک بوته، شاخص برداشت، تعداد قوزه در بوته و همچنین به همراه گروه دوم، بیشترین میانگین تعداد روز تا گلدهی بود. گروه دوم با پنج عضو، دارای بیشترین میانگین ارتفاع بوته، وزن بذر تک بوته و زیست توده، کمترین میانگین وزن صد دانه و همچنین به همراه گروه اول، بیشترین میانگین تعداد روز تا گلدهی بود. گروه سوم با ۱۶۲ عضو به همراه گروه پنجم، دارای کمترین میانگین تعداد روز تا گلدهی بود. گروه پنجم با ۲۲۰ عضو، دارای بیشترین میانگین شاخص برداشت، وزن صد دانه، تعداد قوزه در بوته و کمترین میانگین ارتفاع بوته، زیست توده، و همچنین به همراه گروه سوم، کمترین میانگین تعداد روز تا گلدهی بود. گروه دوم بیشترین فاصله را از سایر گروه‌ها دارا بود (جدول ۷).

از آن‌جا که صفات مورد بررسی روی ژرم‌پلاسم‌های متفاوت در نقاط متفاوت جهان کاملاً منطبق نیست بررسی مقایسه‌ای از نظر عوامل جداکننده گروه‌ها، در تجزیه خوش‌های، دشوار است، ولی می‌توان گفت که بر اساس

براساس منشاء، از نظر تمام صفات مذکور در سطح احتمال یک درصد دارای تفاوت معنی‌دار بودند. براساس نتایج مقایسه میانگین‌ها، نمونه‌های فرانسه، الجزیره، کره جنوبی، کنیا، رومانی، قبرس و ایتالیا با کمترین میانگین تعداد روز تا گلدهی و نمونه‌های آرژانتین و افغانستان با بیشترین میانگین تعداد روز تا گلدهی، به طور متمایز از نمونه‌های سایر کشورها قرار گرفتند. نمونه‌های ایتالیا و کنیا با کمترین میانگین ارتفاع بوته و نمونه‌های اکراین با بیشترین میانگین ارتفاع بوته، در گروهی جداگانه از نمونه‌های سایر کشورها قرار گرفتند. نمونه‌های بلغارستان با کمترین میانگین وزن بذر تک بوته و نمونه‌های روسیه با بیشترین میانگین وزن بذر تک بوته، دارای تفاوت معنی‌دار با نمونه‌های سایر کشورها بودند. نمونه‌های ارمنستان، پاکستان، کره جنوبی، رومانی و لهستان با کمترین میانگین زیست توده و نمونه‌های اسپانیا با بیشترین میانگین زیست توده، به طور متمایز از نمونه‌های سایر کشورها قرار گرفتند. نمونه‌های هندوستان و روسیه با کمترین میانگین شاخص برداشت و نمونه‌های مجارستان با بیشترین میانگین شاخص برداشت، در گروهی جداگانه از نمونه‌های سایر کشورها قرار گرفتند. نمونه‌های سوئد با کمترین میانگین وزن صد دانه و نمونه‌های سودان با بیشترین میانگین وزن صد دانه، دارای تفاوت معنی‌دار با نمونه‌های سایر کشورها بودند. نمونه‌های کانادا و ایتالیا با

جدول ۶- میانگین صفات گروههای حاصل از تجزیه خوشای به روش K means در ژرمپلاسم گلرنگ

Table 6. Trait means of groups developed by K means clustering method in safflower germplasm

Traits	صفات	کلاستر				
		1	2	3	4	5
Days to %50 flowering	روز تا گلدهی %۵۰	63.00	63.00	61.00	62.00	61.00
Plant height (cm)	ارتفاع بوته	62.00	71.00	60.00	62.00	56.00
Plant seed weight (g)	عملکرد تک بوته	9.10	14.00	11.20	9.80	13.30
Biomass (g)	زیست توده	1075.00	1544.00	419.00	758.00	123.00
Harvest Index	شاخص برداشت	13.05	13.46	16.50	15.57	21.08
100 seed weight (g)	وزن صد دانه	3.80	3.70	4.10	4.00	4.20
Head (capitulum) number	تعداد قوزه در بوته	17.23	18.07	20.56	17.53	27.05
Number of Cases in each Cluster	تعداد اعضای هر گروه	35.00	5.00	162.00	112.00	220.00

جدول ۷- فواصل بین گروههای تشکیل شده حاصل از

تجزیه خوشای K means در نمونههای ژنتیکی ژرمپلاسم گلرنگ

Table 7. Distance between groups constructed by K means clustering method
in germplasm of safflower

Cluster گروه	1	2	3	4
2	469.54			
3	655.56	1125.00		
4	316.89	786.37	338.68	
5	951.64	1421.00	296.13	634.79


نزدیکی کشورهای فلسطین اشغالی، عراق و پاکستان قرار داشت (شکل ۱).

میزان کم تولید دانه‌های روغنی در کشورهایی مانند ایران که در آن‌ها شرایط خشک در مناطق وسیعی حاکم است، سبب شده که گیاه گلنگ در چند سال گذشته مورد توجه قرار گیرد. همچنین تمایل مصرف کنندگان برای استفاده از روغن سالم با مقدار کم‌تر از چربی‌های اشباع که در گلنگ به خوبی شناخته شده است و با توجه به تغییرات اقلیمی که باعث تشدید گرما، کاهش میزان بارندگی و سختی بیش‌تر شرایط رشد گیاهان خواهد شد، گلنگ می‌تواند جایگاه مناسبی در الگوی کشت، به خصوص در مناطق خشک جهان و ایران داشته باشد. بر این اساس وجود پایه ژنتیکی و ژرم‌پلاسم غنی، که از نظر صفات عمومی، اختصاصی و چگونگی واکنش به تنش‌های محیطی شناسایی و ارزیابی شده باشد، در فرآیند اصلاح ضرورت دارد. در این تحقیق، تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم خارجی گلنگ با نکثر ژن گیاهی ملی ایران مورد بررسی قرار گرفت. مجموع نتایج تحقیق نشان‌دهنده تنوع قابل توجهی بود. شاخص‌ها و تجزیه‌های متفاوت، این تنوع را بر اساس صفات مورفو‌لوزیک پر اهمیتی مثل رنگ گل، شدت خارداری برآکته‌ها و تعداد قوزه در بوته به خوبی نشان دادند. تفسیر صفات و قابلیت استفاده از نمونه‌های ژنتیکی مربوطه بر اساس اهداف بهنژادی موردنظر

نتایج تجزیه خوش‌های برای ژرم‌پلاسم گیاه مشابه در سایر تحقیقات، گروه‌ها بیش‌تر بر اساس کدام صفات متمایز شده‌اند. بر این اساس در تجزیه خوش‌های صفات مورد بررسی ژرم‌پلاسم گلنگ در پاکستان عوامل یا صفات اصلی جداکننده گروه‌ها، ارتفاع گیاه، تعداد روزه ر رسیدن، تعداد قوزه در بوته، تعداد دانه در قوزه و عملکرد بوته ذکر شده است، که در مقادیر متفاوت باعث جدایی نمونه‌ها شده بودند (Shinwari *et al.*, 2014).

نمونه‌های ژنتیکی مورد بررسی بر اساس منشاء به خوبی در نمودار بای‌پلات حاصل از مقیاس‌بندی چند بعدی پراکنده شدند. در یک انتهای قطر متصل کننده ناحیه سمت چپ بالا به سمت راست پایین، کشورهای لهستان و استرالیا و در سوی دیگر فرانسه، ازبکستان و منشاء ناشناخته، قرار داشتند که نشان‌دهنده حداقل فاصله بین این دو گروه از کشورها است. همچنین در یک انتهای قطر متصل کننده ناحیه سمت راست بالا به سمت چپ پایین، کشورهای روسیه، بنگلادش و اسپانیا و در سوی دیگر کشورهای سوریه، مجارستان و ترکمنستان قرار داشتند که در این حالت نیز بیانگر حداقل فاصله بین این دو گروه از کشورها است.

کشورهای ایتالیا، دانمارک و اردن در بخش مرکزی نمودار قرار گرفتند که بیانگر فاصله تقریباً یکسان آن‌ها با کشورهای حاشیه‌ای نمودار است. مبدأ ناشناخته به کشورهای ایتالی و فرانسه نزدیک‌تر بود. نمونه‌های ایران در



شکل ۱- بای پلات مربوط به پراکنش کشورهای منشاء نمونه‌های ژنتیکی گلرنگ بر اساس مقیاس‌بندی چند بعدی

Fig. 1. Biplot related to the distribution of country of origin of safflower accessions based on multidimensional scaling

For abbreviations of country of origins see Table 1.

برای نام کشورهای مبدا به جدول ۱ مراجعه شود.

صد دانه و نهایتاً عملکرد دانه در بوته مورد توجه قرار گیرد. در مجموع نتایج نشان داد ژرمپلاسم مورد بررسی از سطح قابل توجهی از تنوع برخوردار بوده و می‌تواند در برنامه‌های به نژادی آینده مورد استفاده قرار گیرد.

می‌تواند متفاوت باشد. به این ترتیب هر محقق می‌تواند با توجه به اهداف خود کلکسیون را مورد بهره‌برداری قرار دهد. به طور مثال در این تحقیق، انتخاب در ژرمپلاسم می‌تواند بر اساس صفات مهم اقتصادی مانند دوره‌های فنولوژیک، تعداد قوزه در بوته، تعداد دانه در قوزه و وزن

References

- Abbasali, M., Jafaraghiae, M., and Vaezie, S. 2006.** Evaluation of statistical parameters, correlations between characters and assessment of genetic diversity of safflower germplasm of National Plant Gene Bank of Iran, Proceedings of The 9th Iranian Crop Sciences Congress, Aboureyhan Campus of University of Tehran, Pakdasht, Iran (in Persain).

Anonymous 2015. <http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor>

Anonymous 1981. Descriptor list for safflower. IBPGR Secretariat, Rome, Italy.

- Ashri, A., and Knowles, P.F. 1960.** Cytogenetics of safflower (*Carthamus L.*) species and their hybrids. *Agronomy Journal* 52: 11–17.
- Dwivedi, S. L., Upadhyaya, H. D., and Hegde, D. M. 2005.** Development of core collection using geographic information and morphological descriptors in safflower (*Carthamus tinctorius L.*) germplasm. *Genetic Resources and Crop Evolution* 52(7): 821-830.
- Hatamzadeh, H. 2008.** Study on traits related to seed yield in safflower by factor analysis. *Seed and Plant* 24(3): 563-578 (in Persian).
- Jamshid-Moghadam, M., Pourdad, S. S., and Hatamzadeh, H. 2006.** Investigation of safflower germplasm in autumn planting under dry-land conditions, Proceedings of the 9th Iranian Crop Sciences Congress, Aboureyhan Campus of University of Tehran, Pakdasht, Tehran, Iran (in Persian).
- Khajehpour, M. R. 2004.** Industrial Plants. Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran. 571 pp. (in Persian).
- Knowles, P. F. 1969.** Centers of plant diversity and conservation of crop germplasm: Safflower. *Economic Botany* 23(4): 324-329.
- Kumar, H., Pillai, R. S. N., and Singh, R. B. 1981.** Cytogenetic studies in safflower. Proceedings of the 1st International Safflower Conference, Davis, CA, USA. pp. 126–136.
- Koocheki, A., and Khajeh Hosseini, M. 2008.** Modern Agronomy Hand Book. Jihad-e- Daneshghahi, Mashhad, Iran. 704 pp. (in Persian).
- Maleki Nejad, R., and Majidi, M. 2014.** Association of seed yield, oil and related traits in safflower genotypes under normal and drought stress. *Iranian Journal of Field Crops Research* 13(1): 109-119 (in Persian).
- Patel, J.S., and Narayana, G.V. 1935.** Chromosome numbers in safflower. *Current Science* 4: 412.
- Pourdad, S. S. 2000.** A Decade Reseaces of Safflower Breeding in Dryland Condition: Achievements and Challenges in Iran. Third International Seminar on Oilseeds and Edible Oils, Center for Knowledge and Oilseeds Industry, Coordination Center of Science and Industry Oilseeds, Tehran, Iran (in Persian).
- Pourdad S. S., and Jamshid-Moghaddam, M. 2013.** Study on genetic variation in

safflower collection (*Carthamus tinctorius* L.) under rainfed condition. Iranian Journal of Dryland Agriculture 1(3): 1-16 (in Persian).

Richharia, R. H., and Kotval, J. P. 1940. Chromosome numbers in safflower. Current Science 9: 73-74.

Shannon, C. E. 1948. A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal 27: 379-423.

Shinwari, Z. K., Rehman, H., and Rabbani, M.A. 2014. Morphological traits based genetic diversity in safflower (*Carthamus tinctorius* L.). Pakistan Journal of Botany 46(4): 1389-1395.

Singh, R. J. 2006. Landmark Research in Oilseed Crops. Genetic Resources, Chromosome Engineering, and Crop Improvement: Oilseed Crops (Vol. 4). CRC Press, Boca Raton, Florida, USA.

Vavilov, N.I. 1951. The Origin, Variation, Immunity and Breeding of Cultivated Plants: Selected Writings (Vol. 13, No. 1-6). Ronald Press, New York, USA.

Weiss, E.A. 1971. Castor, Sesame and Safflower. Leonard Hill Books, London, UK.

Zhang, Z., and Johnson, R.C. 1999. Safflower Germplasm Collection Directory. IPGRI Office for East Asia, Beijing, China.